

【診療科:泌尿器科】

がん種		レジメン名	レジメン内容	インターバル	注意事項
腎細胞癌	1	Nivolumab	オブジーボ 240mg/body (30分) day1	14日	
腎細胞癌	2	Nivolumab(4週)	オブジーボ 480mg/body (30分) day1	28日	
腎細胞癌	3	Nivolumab+Ipilimumab	オブジーボ 240mg/body (30分) day1 ヤーボイ 1mg/kg (30分) day1	21日	IMDCリスク分類がintermediate又はpoorリスクの患者対象 ヤーボイは最大4回まで
腎細胞癌	4	Nivolumab+Cabozantinib	オブジーボ 240mg/body (30分) day1 カボメティクス 40mg×1(内服)連日	14日	
腎細胞癌	5	Nivolumab+Cabozantinib(4週)	オブジーボ 480mg/body (30分) day1 カボメティクス 40mg×1(内服)連日	28日	
腎細胞癌	6	Pembrolizumab+Axitinib	キイトルーダ 200mg/body (30分) day1 インライタ 5mg×2(内服)連日	21日	
腎細胞癌	7	Pembrolizumab+Axitinib(6週)	キイトルーダ 400mg/body (30分) day1 インライタ 5mg×2(内服)連日	42日	
腎細胞癌	8	Pembrolizumab+Lenvatinib	キイトルーダ 200mg/body (30分) day1 レンビマ 20mg×1(内服)連日	21日	
腎細胞癌	9	Pembrolizumab+Lenvatinib(6週)	キイトルーダ 400mg/body (30分) day1 レンビマ 20mg×1(内服)連日	42日	
腎細胞癌	10	Avelumab+Axitinib	バベンチオ 10mg/kg (1時間) day1 インライタ 5mg×2(内服)連日	14日	
腎細胞癌	11	テムシロリムス	トーリセル 25mg/body (1時間) day1,8,15,22	28日	

【診療科:泌尿器科】

がん種		レジメン名	レジメン内容	インターバル	注意事項
腎細胞癌	12	Pembrolizumab	キイトルーダ 200mg/body (30分) day1	21日	
腎細胞癌	13	Pembrolizumab (6週)	キイトルーダ 400mg/body (30分) day1	42日	
腎・後腹膜肉腫	1	DXR+IFM	イホマイド 2000mg/m2 (4時間) day1,2,3,4,5 ドキシソルピシン 30mg/m2 (30分) day1,2	21日	
腎・後腹膜肉腫	2	DXR	ドキシソルピシン 30mg/m2 (30分) day1,2	21日	
腎・後腹膜肉腫	3	GEM+DOC	ゲムシタビン 900mg/m2 (30分) day1,8 ドセタキセル 70mg/m2 (1時間) day8	21日	
前立腺癌	1	DOC+PSL	ドセタキセル 60-75mg/m2 (3時間) day1 プレドニン 10mg/body (内服) 連日	21日	
前立腺癌	2	カバジタキセル+PSL	カバジタキセル 25mg/m2 (1時間) day1 プレドニン 10mg/body (内服) 連日	21日	
前立腺癌	3	DOC+ダロルタミド	ドセタキセル 60-75mg/m2 (3時間) day1 ニューベクオ 600mg/body × 2 (内服) 連日	21日	ADT (LHRHアゴニスト/アンタゴニストまたは精巣摘除術) 併用 プレドニンを併用する場合がある ドセタキセルは最大6サイクル
膀胱癌	1	EV+Pembrolizumab	パドセブ 1.25mg/kg (30分) day1,8 キイトルーダ 200mg/body (30分) day1	21日	
膀胱癌	2	GEM+CDDP	ゲムシタビン 1000mg/m2 (30分) day1,8,15 シスプラチン 70mg/m2 (3時間) day2	28日	
膀胱癌	3	GEM+CDDP(3-week)	ゲムシタビン 1000mg/m2 (30分) day1,8 シスプラチン 70mg/m2 (3時間) day2	21日	

【診療科：泌尿器科】

がん種		レジメン名	レジメン内容	インターバル	注意事項
膀胱癌	4	GEM+CBDCA	ゲムシタビン 800mg/m ² (30分) day1,8 カルボプラチン AUC5 (2時間) day1	21日	
膀胱癌	5	Pembrolizumab	キイトルーダ 200mg/body (30分) day1	21日	
膀胱癌	6	Pembrolizumab(6週)	キイトルーダ 400mg/body (30分) day1	42日	
膀胱癌	7	エンホルツマブ ペドテン	パドセブ 1.25mg/kg (30分) day1,8,15	28日	
膀胱癌	8	M-VAC	メソトレキセート 30mg/m ² (1時間) day1,15,22 エグザール 3mg/m ² (1時間) day2,15,22 ドキシソビシン 30mg/m ² (1時間) day2 シスプラチン 70mg/m ² (3時間) day2	28日	
膀胱癌	9	PAC+CBDCA	パクリタキセル 180mg/m ² (3時間) day1 カルボプラチン AUC5 (2時間) day1	21日	
膀胱癌	10	Durvalumab+GC(CCr60以上)	イミフィンジ 1500mg/body (1時間) day1 ゲムシタビン 1000mg/m ² (30分) day1,8 シスプラチン 70mg/m ² (2時間) day1	21日	イミフィンジ 30kg以下の場合 20mg/kg 術前補助療法 最大4サイクル
膀胱癌	11	Durvalumab+GC(CCr40-60)	イミフィンジ 1500mg/body (1時間) day1 ゲムシタビン 1000mg/m ² (30分) day1,8 シスプラチン 35mg/m ² (2時間) day1,8	21日	イミフィンジ 30kg以下の場合 20mg/kg 術前補助療法 最大4サイクル
膀胱癌	12	Durvalumab	イミフィンジ 1500mg/body (1時間) day1	28日	イミフィンジ 30kg以下の場合 20mg/kg 術後補助療法 最大8サイクル
膀胱癌	13	Nivolumab	オプジーボ 240mg/body (30分) day1	14日	術後補助療法 最長12か月間
膀胱癌	14	Nivolumab(4週)	オプジーボ 480mg/body (30分) day1	28日	術後補助療法 最長12か月間

【診療科:泌尿器科】

がん種		レジメン名	レジメン内容	インターバル	注意事項
胚細胞腫瘍	1	BEP	エトポシド 100mg/m2 (2.5時間) day1,2,3,4,5 ブレオマイシン 30mg/body (筋注) day1,8,15 シスプラチン 20mg/m2 (3時間) day1,2,3,4,5	21日	IGCC分類 good risk は3コース intermediate or poor riskは4コース投与する
陰茎癌	1	5-FU+CDDP	フルオロウラシル 960mg/m2 (24時間) day2,3,4,5,6 シスプラチン 100mg/m2 (2.5時間) day1	21日	
尿道癌	1	GEM+CDDP	ゲムシタビン 1000mg/m2 day1,8 シスプラチン 70mg/m2 day2	21日	
臓器横断	1	Pembrolizumab(3週)	キイトルーダ 200mg/body (30分) day1	21日	MSI HighまたはTMB Highの場合に使用
臓器横断	2	Pembrolizumab(6週)	キイトルーダ 400mg/body (30分) day1	42日	MSI HighまたはTMB Highの場合に使用