

【診療科:消化器外科】

がん種	レジメン名	レジメン内容	インターバル	注意事項
食道癌	1 FP	フルオロウラシル 700mg/m ² (24時間) day1,2,3,4,5 シスプラチン 70mg/m ² (2時間) day1	21日	
食道癌	2 DCF	フルオロウラシル 750mg/m ² (24時間) day1,2,3,4,5 ドセタキセル 70mg/m ² (90分) day1 シスプラチン 70mg/m ² (90分) day1	21日	
食道癌	3 Nivolumab	オプジー ^ボ 240mg/body (30分) day1	14日	
食道癌	4 Nivolumab(4週)	オプジー ^ボ 480mg/body (30分) day1	28日	
食道癌	5 Pembrolizumab	キイトルーダ 200mg/body (30分) day1	21日	
食道癌	6 Pembrolizumab(6週)	キイトルーダ 400mg/body (30分) day1	42日	
食道癌	7 Pembrolizumab+FP	キイトルーダ 200mg/body (30分) day1 フルオロウラシル 800mg/m ² (24時間) day1,2,3,4,5 シスプラチン 80mg/m ² (2時間) day1	21日	
胃癌	1 SP	エスワンタイホウ 40mg/m ² × 2 day1-21 シスプラチン 60mg/m ² (2時間) day8	35日	
胃癌	2 XP	カベシタビン 1000mg/m ² × 2 day1-14 シスプラチン 80mg/m ² (2時間) day1	21日	
胃癌	3 SOX	エスワンタイホウ 40mg/m ² × 2 day1-14 オキサリプラチン 100mg/m ² (2時間) day1	21日	
胃癌	4 CapeOX	カベシタビン 1000mg/m ² × 2 day1-14 オキサリプラチン 130mg/m ² (2時間) day1	21日	

【診療科:消化器外科】

がん種	レジメン名	レジメン内容	インターバル	注意事項
胃癌	5 mFOLFOX6	レボホリナート 200mg/m ² (2時間) day1 オキサリプラチン 85mg/m ² (2時間) day1 フルオロウラシル 400mg/m ² (10分) day1 フルオロウラシル 2400mg/m ² (46時間) day1	14日	
胃癌	6 SPT 初回	ハーセプチンまたはトラスツズマブ 8mg/kg (90分) day1 エスワンタイホウ 40mg/m ² × 2 day1-14 シスプラチン 60mg/m ² (2時間) day1	21日	
胃癌	7 SPT 2回目以降	ハーセプチンまたはトラスツズマブ 6mg/kg (30分) day1 エスワンタイホウ 40mg/m ² × 2 day1-14 シスプラチン 60mg/m ² (2時間) day1	21日	
胃癌	8 XP+トラスツズマブ 初回	ハーセプチンまたはトラスツズマブ 8mg/kg (90分) day1 カベシタビン 1000mg/m ² × 2 day1-14 シスプラチン 80mg/m ² (2時間) day1	21日	
胃癌	9 XP+トラスツズマブ 2回目以降	ハーセプチンまたはトラスツズマブ 6mg/kg (30分) day1 カベシタビン 1000mg/m ² × 2 day1-14 シスプラチン 80mg/m ² (2時間) day1	21日	
胃癌	10 Nivo+SOX	オブジーボ 360mg/body (30分) day1 エスワンタイホウ 40mg/m ² × 2 day1-14 オキサリプラチン 100mg/m ² (2時間) day1	21日	
胃癌	11 Nivo+CapeOX	オブジーボ 360mg/body (30分) day1 カベシタビン 1000mg/m ² × 2 day1-14 オキサリプラチン 130mg/m ² (2時間) day1	21日	
胃癌	12 Nivo+mFOLFOX6	オブジーボ 240mg/body (30分) day1 レボホリナート 200mg/m ² (2時間) day1 オキサリプラチン 85mg/m ² (2時間) day1 フルオロウラシル 400mg/m ² (10分) day1 フルオロウラシル 2400mg/m ² (46時間) day1	14日	
胃癌	13 DCS	ドセタキセル 30mg/m ² (1時間) day1,15 シスプラチン 30mg/m ² (1時間) day1,15 エスワンタイホウ 40mg/m ² × 2 day1-14	28日	
胃癌	14 DS	ドセタキセル 40mg/m ² (60分) day1 エスワンタイホウ 40mg/m ² × 2 day1-14	21日	
胃癌	15 RAM+PAC	サイラムザ 8mg/kg (30分) day1,15 バクリタキセル 80mg/m ² (1時間) day1,8,15	28日	サイラムザ 初回60分、2回目以降30分

【診療科:消化器外科】

がん種	レジメン名	レジメン内容	インターバル	注意事項
胃癌	16 RAM+nab-PAC	サイラムザ 8mg/kg (30分) day1,15 アブラキサン 100mg/m2 (30分) day1,8,15	28日	サイラムザ 初回60分、2回目以降30分
胃癌	17 Nivolumab	オプジー ^ボ 240mg/body (30分) day1	14日	
胃癌	18 Nivolumab(4週)	オプジー ^ボ 480mg/body (30分) day1	28日	
胃癌	19 CPT-11	イリノテカン 150mg/m2 (90分) day1	14日	
胃癌	20 PAC(weekly)	バクリタキセル 80mg/m2 (1時間) day1,8,15	28日	
胃癌	21 nab-PAC(weekly)	アブラキサン 100mg/m2 (30分) day1,8,15	28日	
胃癌	22 Trastuzumab Deruxtecan	エンハーツ 6.4mg/kg(30分) day1	21日	初回90分、2回目以降30分
胃癌	23 RAM	サイラムザ 8mg/kg (30分) day1	14日	初回60分、2回目以降30分
胃癌	24 S-1+PAC	エスワンタイホウ 40mg/m2×2 day1-14 バクリタキセル 60mg/m2 (1時間) day1,8	21日	
胃癌	25 DOC(bi-weekly)	ドセタキセル 40mg/m2 (1時間) day1,15	21日	
胃癌	26 PAC iv+ip	バクリタキセル 50mg/m2 (1時間) day1,8 バクリタキセル 20mg/m2 (腹腔内) day1,8	21日	

【診療科:消化器外科】

がん種	レジメン名	レジメン内容	インターバル	注意事項
胃癌	27 SOX+PTXip	エスワンタイホウ 40mg/m ² × 2 day1-14 パクリタキセル 40mg/m ² (腹腔内) day1,8 オキサリプラチン 100mg/m ² (2時間) day1	21日	
胃癌	28 CapeOX+PTXip	カペシタビン 1000mg/m ² × 2 day1-14 パクリタキセル 40mg/m ² (腹腔内) day1,8 オキサリプラチン 130mg/m ² (2時間) day1	21日	
胃癌	29 DCS+DOCip	ドセタキセル 30mg/m ² (1時間) day1,15 シスプラチン 30mg/m ² (1時間) day1,15 エスワンタイホウ 40mg/m ² × 2 day1-14 ドセタキセル (腹腔内) day1	28日	
胃癌	30 DS+DOCip	ドセタキセル 40mg/m ² (1時間) day1 エスワンタイホウ 40mg/m ² × 2 day1-14 ドセタキセル (腹腔内) day1	21日	
胃癌	31 S-1+DOC+DOCip+Tmab 初回	ドセタキセル 40mg/m ² (1時間) day1 エスワンタイホウ 40mg/m ² × 2 day1-14 ドセタキセル (腹腔内) day1 ハーセプチンまたはトラスツズマブBS 8mg/kg (90分) day1	21日	
胃癌	32 S-1+DOC+DOCip+Tmab 2回目以降	ドセタキセル 40mg/m ² (1時間) day1 エスワンタイホウ 40mg/m ² × 2 day1-14 ドセタキセル (腹腔内) day1 ハーセプチンまたはトラスツズマブBS 6mg/kg (30分) day1	21日	
胃癌	33 S-1+PTXiv+ip	エスワンタイホウ 40mg/m ² × 2 day1-14 パクリタキセル 60mg/m ² (1時間) day1,8 パクリタキセル (腹腔内) day1,8	21日	
胃癌	34 S-1+PTXiv+ip+Tmab 初回	エスワンタイホウ 40mg/m ² × 2 day1-14 パクリタキセル 60mg/m ² (1時間) day1,8 パクリタキセル (腹腔内) day1,8 ハーセプチンまたはトラスツズマブBS 8mg/kg (90分) day1	21日	
胃癌	35 S-1+PTXip+Tmab 2回目以降	エスワンタイホウ 40mg/m ² × 2 day1-14 パクリタキセル 60mg/m ² (1時間) day1,8 パクリタキセル (腹腔内) day1,8 ハーセプチンまたはトラスツズマブBS 6mg/kg (30分) day1	21日	
大腸癌	1 mFOLFOX6	レボホリナート 200mg/m ² (2時間) day1 オキサリプラチン 85mg/m ² (2時間) day1 フルオロウラシル 400mg/m ² (10分) day1 フルオロウラシル 2400mg/m ² (46時間) day1	14日	
大腸癌	2 mFOLFOX6+BEV	アバスチンまたはベバシズマブBS 5mg/kg (30分) day1 レボホリナート 200mg/m ² (2時間) day1 オキサリプラチン 85mg/m ² (2時間) day1 フルオロウラシル 400mg/m ² (10分) day1 フルオロウラシル 2400mg/m ² (46時間) day1	14日	アバスチンまたはベバシズマブBS 初回90分、2回目60分、3回目以降30分

【診療科:消化器外科】

がん種	レジメン名	レジメン内容	インターバル	注意事項
大腸癌	3 mFOLFOX6+Pmab	ベクティビックス 6mg/kg (1時間) day1 レボホリナート 200mg/m ² (2時間) day1 オキサリプラチニン 85mg/m ² (2時間) day1 フルオロウラシル 400mg/m ² (10分) day1 フルオロウラシル 2400mg/m ² (46時間) day1	14日	
大腸癌	4 FOLFIRI	レボホリナート 200mg/m ² (2時間) day1 イリノテカン 150mg/m ² (90分) day1 フルオロウラシル 400mg/m ² (10分) day1 フルオロウラシル 2400mg/m ² (46時間) day1	14日	
大腸癌	5 FOLFIRI+BEV	アバスチンまたはペバシズマブBS 5mg/kg (30分) day1 レボホリナート 200mg/m ² (2時間) day1 イリノテカン 150mg/m ² (90分) day1,15 フルオロウラシル 400mg/m ² (10分) day1 フルオロウラシル 2400mg/m ² (46時間) day1	14日	アバスチンまたはペバシズマブBS 初回90分、2回目60分、3回目以降30分
大腸癌	6 FOLFIRI+Pmab	ベクティビックス 6mg/kg (1時間) day1 レボホリナート 200mg/m ² (2時間) day1 イリノテカン 140mg/m ² (90分) day1 フルオロウラシル 400mg/m ² (10分) day1 フルオロウラシル 2400mg/m ² (46時間) day1	14日	
大腸癌	7 FOLFIRI+RAM	サイラムザ 8mg/kg (30分) day1 レボホリナート 200mg/m ² (2時間) day1 イリノテカン 140mg/m ² (90分) day1 フルオロウラシル 400mg/m ² (10分) day1 フルオロウラシル 2400mg/m ² (46時間) day1	14日	サイラムザ 初回60分、2回目以降30分
大腸癌	8 FOLFIRI + Aflibercept	ザルトラップ 4mg/kg (60分) day1 レボホリナート 200mg/m ² (2時間) day1 イリノテカン 150mg/m ² (90分) day1 フルオロウラシル 400mg/m ² (10分) day1 フルオロウラシル 2400mg/m ² (46時間) day1	14日	
大腸癌	9 XELOX	カペシタビン 1000mg/m ² × 2 day1-14 オキサリプラチニン 130mg/m ² (2時間) day1	21日	
大腸癌	10 XELOX+BEV	アバスチンまたはペバシズマブBS 7.5mg/kg (30分) day1 カペシタビン 1000mg/m ² × 2 day1-14 オキサリプラチニン 130mg/m ² (2時間) day1	21日	アバスチンまたはペバシズマブBS 初回90分、2回目60分、3回目以降30分
大腸癌	11 mXELIRI	カペシタビン 800mg/m ² × 2 day1-14 イリノテカン 200mg/m ² (90分) day1	21日	UGT1A1遺伝子多型*28ホモ、*6ホモ、*28/*6複合ヘテロの場合、イリノテカンを150mg/m ² に減量する
大腸癌	12 mXELIRI+BEV	アバスチンまたはペバシズマブBS 7.5mg/kg (30分) day1 カペシタビン 800mg/m ² × 2 day1-14 イリノテカン 200mg/m ² (90分) day1	21日	UGT1A1遺伝子多型*28ホモ、*6ホモ、*28/*6複合ヘテロの場合、イリノテカンを150mg/m ² に減量する アバスチンまたはペバシズマブBS 初回90分、2回目60分、3回目以降30分
大腸癌	13 SOX	エスワンタイホウ 40mg/m ² × 2 day1-14 オキサリプラチニン 130mg/m ² (2時間) day1	21日	アバスチンまたはペバシズマブBS 初回90分、2回目60分、3回目以降30分

【診療科:消化器外科】

がん種	レジメン名	レジメン内容	インターバル	注意事項
大腸癌	14 SOX+BEV	アバスチンまたはペバシズマブBS 7.5mg/kg (30分) day1 エスワンタイホウ 40mg/m2 × 2 day1-14 オキサリプラチニン 130mg/m2 (2時間) day1	21日	アバスチンまたはペバシズマブBS 初回90分、2回目60分、3回目以降30分
大腸癌	15 IRIS	エスワンタイホウ 40mg/m2 day1-14 イリノテカン 100mg/m2 (90分) day1,15	28日	
大腸癌	16 IRIS+BEV	アバスチンまたはペバシズマブBS 5mg/kg (30分) day1,15 エスワンタイホウ 40mg/m2 day1-14 イリノテカン 100mg/m2 (90分) day1,15	28日	アバスチンまたはペバシズマブBS 初回90分、2回目60分、3回目以降30分
大腸癌	17 FOLFOXIRI	イリノテカン 165mg/m2(1時間)day1 レボホリナート 200mg/m2 (2時間) day1 オキサリプラチニン 85mg/m2 (2時間) day1 フルオロウラシル 3000mg/m2 (46時間) day1	14日	12サイクル終了後は維持療法 アバスチンまたはペバシズマブBS 初回90分、2回目60分、3回目以降30分
大腸癌	18 FOLFOXIRI+BEV	アバスチンまたはペバシズマブBS 5mg/kg (30分) day1 イリノテカン 165mg/m2(1時間)day1 レボホリナート 200mg/m2 (2時間) day1 オキサリプラチニン 85mg/m2 (2時間) day1 フルオロウラシル 3000mg/m2 (46時間) day1	14日	12サイクル終了後は維持療法 アバスチンまたはペバシズマブBS 初回90分、2回目60分、3回目以降30分
大腸癌	19 FOLFOXIRI+BEV維持	アバスチンまたはペバシズマブBS 5mg/kg (30分) day1 レボホリナート 200mg/m2 (2時間) day1 フルオロウラシル 3000mg/m2 (46時間) day1	14日	
大腸癌	20 sLV5FU2	レボホリナート 200mg/m2 (2時間) day1 フルオロウラシル 400mg/m2 (10分) day1 フルオロウラシル 2400mg/m2 (46時間) day1	14日	
大腸癌	21 Cetuximab+CPT-11(weekly)初回	アービタックス 400mg/m2 (2時間) day1 イリノテカン 100mg/m2 (90分) day1,8,15,22 アービタックス 250mg/m2 (1時間) day8,15,22,29,36	42日	
大腸癌	22 Cetuximab+CPT-11(weekly)維持	アービタックス 250mg/m2 (1時間) day1,8,15,22,29,36 イリノテカン 100mg/m2 (90分) day1,8,15,22	42日	
大腸癌	23 Cetuximab+CPT-11(bi-weekly)	アービタックス 500mg/m2 (2時間) day1 イリノテカン 150mg/m2 (90分) day1	14日	
大腸癌	24 Cetuximab(初回)	アービタックス 400mg/m2 (2時間) day1	7日	

【診療科:消化器外科】

がん種	レジメン名	レジメン内容	インターバル	注意事項
大腸癌	25 Cetuximab(維持)	アービタックス 250mg/m2 (1時間) day1	7日	
大腸癌	26 Cetuximab+エンコラフェニブ+ピニメチニブ(初回)	アービタックス 400mg/m2 (2時間) day1 ビラフトビ 300mg/body × 1 (内服) 連日 メクトビ 45mg/body × 2 (内服) 連日	7日	
大腸癌	27 Cetuximab+エンコラフェニブ+ピニメチニブ(維持)	アービタックス 250mg/m2 (1時間) day1 ビラフトビ 300mg/body × 1 (内服) 連日 メクトビ 45mg/body × 2 (内服) 連日	7日	
大腸癌	28 Panitumumab	ペクティビックス 6mg/kg (1時間) day1	14日	
大腸癌	29 Cape+BEV	アバスチンまたはベバシズマブBS 5mg/kg (30分) day1,15 カベシタビン 1000mg/m2 × 2 day1-14	28日	アバスチンまたはベバシズマブBS 初回90分、2回目60分、3回目以降30分
大腸癌	30 TFTD+BEV	アバスチンまたはベバシズマブBS 5mg/kg (30分) day1,15 ロンサーフ 35mg/m2 × 2 day1-5,8-12	28日	アバスチンまたはベバシズマブBS 初回90分、2回目60分、3回目以降30分
大腸癌	31 TEGAFIRI	イリノテカン 150mg/m2 (90分) day1 ユーエフティ 100mg/m2 × 3 (内服) day1-14 ユーゼル 25mg/body × 3 (内服) day1-14	21日	
膵癌	1 GEM	ゲムシタビン 1000mg/m2 (30分) day1,8,15	21日	
膵癌	2 nab-PAC+GEM	アブラキサン 125mg/m2 (30分) day1,8,15 ゲムシタビン 1000mg/m2 (30分) day1,8,15	28日	
膵癌	3 FOLFIRINOX	オキサリプラチン 85mg/m2 (2時間) day1 レボホリナート 200mg/m2 (2時間) day1 イリノテカン 180mg/m2 (90分) day1 フルオロウラシル 400mg/m2 (15分) day1 フルオロウラシル 2400mg/m2 (46時間) day1	14日	
膵癌	4 mFOLFIRINOX	オキサリプラチン 85mg/m2 (2時間) day1 レボホリナート 200mg/m2 (2時間) day1 イリノテカン 150mg/m2 (90分) day1 フルオロウラシル 2400mg/m2 (46時間) day1	14日	

【診療科:消化器外科】

がん種	レジメン名	レジメン内容	インターバル	注意事項
膵癌	5 nab-IRI+5-FU/LV	レボホリナート 200mg/m ² (2時間) day1 オニバイド 70mg/m ² (90分) day1 フルオロウラシル 2400mg/m ² (46時間) day1	14日	
膵癌	6 GEM+S-1	ゲムシタビン 1000mg/m ² (30分) day1,8 エスワンタイホウ 30mg/m ² × 2 (内服) day1-14	21日	ゲムシタビン 1000mg/m ² (30分) day1,15 エスワンタイホウ 40mg/m ² × 2 (内服) day1-14、インターバル28日とする場合あり
胆道癌	1 CDDP+GEM	シスプラチン 25mg/m ² (2時間) day1,8 ゲムシタビン 1000mg/m ² (30分) day1,8	21日	
胆道癌	2 GEM+S-1	ゲムシタビン 1000mg/m ² (30分) day1,8 エスワンタイホウ 30mg/m ² × 2 (内服) day1-14	21日	ゲムシタビン 1000mg/m ² (30分) day1,15 エスワンタイホウ 40mg/m ² × 2 (内服) day1-14、インターバル28日とする場合あり
神経内分泌腫瘍	1 STZ+5-FU	ザノサー 500mg/m ² (30分) day1,2,3,4,5 フルオロウラシル 400mg/m ² (30分) day1,2,3,4,5	42日	
神経内分泌腫瘍	2 ストレプトゾシン(daily)	ザノサー 500mg/m ² (30分) day1,2,3,4,5	42日	
神経内分泌腫瘍	3 ストレプトゾシン(weekly)	ザノサー 1000mg/m ² (30分) day1,8,15,22	28日	1500mg/m ² まで增量できる
神経内分泌癌	1 CPT-11+CDDP	イリノテカン 60mg/m ² (90分) day1,8,15 シスプラチン 60mg/m ² (1時間) day1	28日	
神経内分泌癌	2 VP-16+CDDP	エトポシド 100mg/m ² (2時間) day1,2,3 シスプラチン 80mg/m ² (1時間) day1	21日	
悪性黒色腫	1 DTIC (5日分割)	ダカルバジン 250mg/m ² (3時間) day1,2,3,4,5	21日	
悪性黒色腫	2 DTIC (標準)	ダカルバジン 900mg/m ² (3時間) day1	21日	

【診療科:消化器外科】

がん種	レジメン名	レジメン内容	インターバル	注意事項
悪性黒色腫	3 Nivolumab	オプジー ^ボ 240mg/body (30分) day1	14日	
悪性黒色腫	4 Nivolumab(4週)	オプジー ^ボ 240mg/body (30分) day1	28日	
臓器横断	1 Pembrolizumab(3週)	キイトルーダ 200mg/body (30分) day1	21日	MSI highの場合に使用
臓器横断	2 Pembrolizumab(6週)	キイトルーダ 400mg/body (30分) day1	42日	MSI highの場合に使用