

【診療科:産科婦人科】

がん種		レジメン名	レジメン内容	インターバル	注意事項
卵巣癌	1	TC	パクリタキセル 175mg/m <sup>2</sup> (3時間) day1 カルボプラチン AUC6 (1時間) day1	21日	
卵巣癌	2	TC+BEV	パクリタキセル 175mg/m <sup>2</sup> (3時間) day1 カルボプラチン AUC6 (1時間) day1 アバステチン 15mg/kg (30分) day1	21日	アバステチン 初回90分、2回目60分、3回目以降30分
卵巣癌	3	DC	ドセタキセル 60mg/m <sup>2</sup> (3時間) day1 カルボプラチン AUC6 (1時間) day1	21日	
卵巣癌	4	DC+BEV	ドセタキセル 60mg/m <sup>2</sup> (3時間) day1 カルボプラチン AUC6 (1時間) day1 アバステチン 15mg/kg (30分) day1	21日	アバステチン 初回90分、2回目60分、3回目以降30分
卵巣癌	5	dd-TC	パクリタキセル 80mg/m <sup>2</sup> (1時間) day1,8,15 カルボプラチン AUC6 (1時間) day1	21日	
卵巣癌	6	DC (weekly)	ドセタキセル 35mg/m <sup>2</sup> (1時間) day1,8,15 カルボプラチン AUC2 (1時間) day1,8,15	28日	
卵巣癌	7	TC (weekly)	パクリタキセル 80mg/m <sup>2</sup> (1時間) day1,8,15 カルボプラチン AUC2 (1時間) day1,8,15	28日	
卵巣癌	8	PLD	ドキシル 40mg/m <sup>2</sup> (90分) day1	28日	
卵巣癌	9	PLD+BEV	ドキシル 40mg/m <sup>2</sup> (90分) day1 アバステチン 10mg/kg (30分) day1,15	28日	アバステチン 初回90分、2回目60分、3回目以降30分
卵巣癌	10	PLD+CBDCA	ドキシル 30mg/m <sup>2</sup> (90分) day1 カルボプラチン AUC5 (1時間) day1	28日	
卵巣癌	11	PLD+CBDCA+BEV	ドキシル 30mg/m <sup>2</sup> (90分) day1 カルボプラチン AUC5 (1時間) day1 アバステチン 10mg/kg (30分) day1,15	28日	アバステチン 初回90分、2回目60分、3回目以降30分

【診療科:産科婦人科】

がん種		レジメン名	レジメン内容	インターバル	注意事項
卵巣癌	12	GEM+CBDCA	ゲムシタピン 800mg/m <sup>2</sup> (30分) day1,8 カルボプラチン AUC4 (1時間) day1	21日	
卵巣癌	13	GPT-11 (Weekly)	イリノテカン 100mg/m <sup>2</sup> (90分) day1,8,15	28日	
卵巣癌	14	ノギテカン	ハイカムチン 1.25mg/m <sup>2</sup> (30分) day1,2,3,4,5	21日	
卵巣癌	15	ノギテカン+BEV	アバスチン 15mg/kg (30分) day1 ハイカムチン 1.25mg/m <sup>2</sup> (30分) day1,2,3,4,5	21日	アバスチン 初回90分、2回目60分、3回目を以降30分
卵巣癌	16	BEV維持	アバスチン 15mg/kg (30分) day1	21日	
卵巣癌	17	オラパリブ+BEV	アバスチン 15mg/kg (30分) day1 リムバーザ 300mg × 2/日 (内服) 連日	21日	アバスチン 初回90分、2回目60分、3回目を以降30分
子宮体癌	1	TC	パクリタキセル 175mg/m <sup>2</sup> (3時間) day1 カルボプラチン AUC6 (1時間) day1	21日	
子宮体癌	2	DC	ドセタキセル 60mg/m <sup>2</sup> (3時間) day1 カルボプラチン AUC6 (1時間) day1	21日	
子宮体癌	3	dd-TC	パクリタキセル 80mg/m <sup>2</sup> (1時間) day1,8,15 カルボプラチン AUC6 (1時間) day1	21日	
子宮体癌	4	AP	ドキソルビシン 60mg/m <sup>2</sup> (10分) day1 シスプラチン 50mg/m <sup>2</sup> (2時間) day1	21日	
子宮体癌	5	Pembrolizumab+Lenvatinib (3週)	キイトルーダ200mg/body (30分) day1 レンビマ 20mg (内服) 連日	21日	

【診療科:産科婦人科】

がん種		レジメン名	レジメン内容	インターバル	注意事項
子宮体癌	6	<b>Pembrolizumab+Lenvatinib (6週)</b>	キイトルーダ400mg/body (30分) day1 レンビマ 20mg (内服) 連日	42日	
子宮頸癌	1	<b>Weekly GDDP(短時間)+RT</b>	シスプラチン 40mg/m2 (90分) day1	7日	計6回が目安
子宮頸癌	2	<b>TP (3hr)</b>	パクリタキセル 175mg/m2 (3時間) day1 シスプラチン 50mg/m2 (2時間) day2	21日	
子宮頸癌	3	<b>TP (3hr)+BEV</b>	パクリタキセル 175mg/m2 (3時間) day1 シスプラチン 50mg/m2 (2時間) day2 アバステン 15mg/kg (30分) day1	21日	アバステン 初回90分、2回目60分、3回目以降30分
子宮頸癌	4	<b>TC</b>	パクリタキセル 175mg/m2 (3時間) day1 カルボプラチン AUC5 (1時間) day1	21日	
子宮頸癌	5	<b>DC</b>	ドセタキセル 60mg/m2 (3時間) day1 カルボプラチン AUC5 (1時間) day1	21日	
子宮頸癌	6	<b>TC+BEV</b>	パクリタキセル 175mg/m2 (3時間) day1 カルボプラチン AUC5 (1時間) day1 アバステン 15mg/kg (30分) day1	21日	アバステン 初回90分、2回目60分、3回目以降30分
子宮頸癌	7	<b>DC+BEV</b>	ドセタキセル 60mg/m2 (3時間) day1 カルボプラチン AUC5 (1時間) day1 アバステン 15mg/kg (30分) day1	21日	アバステン 初回90分、2回目60分、3回目以降30分
子宮頸癌	8	<b>Pembrolizumab+TP</b>	キイトルーダ 200mg/body (30分) day1 パクリタキセル 175mg/m2 (3時間) day1 シスプラチン 50mg/m2 (2時間) day1	21日	
子宮頸癌	9	<b>Pembrolizumab+TC</b>	キイトルーダ 200mg/body (30分) day1 パクリタキセル 175mg/m2 (3時間) day1 カルボプラチン AUC5 (1時間) day1	21日	
子宮頸癌	10	<b>Pembrolizumab+TP+BEV</b>	キイトルーダ 200mg/body (30分) day1 パクリタキセル 175mg/m2 (3時間) day1 シスプラチン 50mg/m2 (2時間) day1 アバステン 15mg/kg (30分) day1	21日	アバステン 初回90分、2回目60分、3回目以降30分

【診療科:産科婦人科】

がん種		レジメン名	レジメン内容	インターバル	注意事項
子宮頸癌	11	<b>Pembrolizumab+TC+BEV</b>	キイトルーダ 200mg/body (30分) day1 パクリタキセル 175mg/m2 (3時間) day1 カルボプラチン AUC5 (1時間) day1 アバステン 15mg/kg (30分) day1	21日	アバステン 初回90分、2回目60分、3回目以降30分
子宮頸癌	12	<b>Cemiplimab</b>	リブタヨ 350mg/body (30分) day1	21日	
子宮頸癌	13	<b>Nedaplatin+CPT-11</b>	イリノテカン 50mg/m2 (90分) day1,8,15 アクプラ 80mg/m2 (2時間) day1	28日	
胚細胞腫	1	<b>BEP</b>	エトポシド 100mg/m2 (2時間) day1,2,3,4,5 シスプラチン 20mg/m2 (2時間) day1,2,3,4,5 ブレオ 20mg/m2 (30分) day2,9,16	21日	
悪性軟部肉腫	1	<b>エリブリン</b>	ハラヴェン 1.4mg/m2 (5分) day1,8	21日	
悪性軟部肉腫	2	<b>トラベクテジン単剤</b>	ヨンデリス 1.2mg/m2 (24時間) day1	21日	
悪性軟部肉腫	3	<b>GEM+DOC</b>	ゲムシタビン 800mg/m2 (30分) day1,8 ドセタキセル 60mg/m2 (1時間) day8	21日	
臓器横断	1	<b>Pembrolizumab(3週)</b>	キイトルーダ200mg/body (30分) day1	21日	MSI HighまたはTMB Highの場合に使用
臓器横断	2	<b>Pembrolizumab(6週)</b>	キイトルーダ400mg/body (30分) day1	42日	MSI HighまたはTMB Highの場合に使用