

【診療科:皮膚科】

がん種	レジメン名	レジメン内容	インターバル	注意事項
悪性黒色腫	1 Nivolumab	オプジーボ 240mg/body (30分) day1	14日	
悪性黒色腫	2 Nivolumab(4週)	オプジーボ 480mg/body (30分) day1	28日	
悪性黒色腫	3 Pembrolizimab	キイトルーダ 200mg/body (30分) day1	21日	
悪性黒色腫	4 Pembrolizimab(6週)	キイトルーダ 400mg/body (30分) day1	42日	
悪性黒色腫	5 Nivolumab+Ipilimumab	オプジーボ 80mg/body (30分) day1 ヤーポイ 3mg/kg (30分) day1	21日	ヤーポイは最大4回まで
悪性黒色腫	6 Ipilimumab	ヤーポイ 3mg/kg (30分) day1	21日	ヤーポイは最大4回まで

【診療科:皮膚科】

がん種	レジメン名	レジメン内容	インターバル	注意事項
悪性黒色腫	7 DTIC	ダカルバジン 1000mg/m ² (3時間) day1	21日	
血管肉腫	1 PAC(weekly)	パクリタキセル 100mg/m ² (1時間) day1,8,15,22,29,36	56日	
悪性リンパ腫	1 R-CHOP	リツキサンまたはリツキシマブBS 375mg/m ² (注意事項参照) day1 オンコピン 1.4mg/m ² (10分) day2 ドキシソルピシン 50mg/m ² (30分) day2 エンドキササン 750mg/m ² (2時間) day2 ブレドニン 100mg/body day1-5	21日	最大8コース リツキサンまたはリツキシマブBS [1コース目] 50mL/hで開始、30分毎に50mL/hずつ速度を上げ、最大400mL/hまで [2コース目以降] 100mL/hで開始、30分毎に100mL/hずつ速度を上げ、最大400mL/hまで [2コース目以降] 臨床的に重篤な心疾患がなく、初回投与時に発現した副作用が軽微であり、かつ投与前の末梢血リンパ球数が5000/μL未満である場合、90分間で投与することができる。最初の30分で投与量の20% (100mL/hr)、その後60分で投与量の80% (200mL/hr)を投与
悪性リンパ腫	2 R-THP-COP	リツキサンまたはリツキシマブBS 375mg/m ² (注意事項参照) day1 オンコピン 1.4mg/m ² (10分) day2 テラルピシン 50mg/m ² (30分) day2 エンドキササン 750mg/m ² (2時間) day2 ブレドニン 100mg/body day1-5	21日	リツキサンまたはリツキシマブBS [1コース目] 50mL/hで開始、30分毎に50mL/hずつ速度を上げ、最大400mL/hまで [2コース目以降] 100mL/hで開始、30分毎に100mL/hずつ速度を上げ、最大400mL/hまで [2コース目以降] 臨床的に重篤な心疾患がなく、初回投与時に発現した副作用が軽微であり、かつ投与前の末梢血リンパ球数が5000/μL未満である場合、90分間で投与することができる。最初の30分で投与量の20% (100mL/hr)、その後60分で投与量の80% (200mL/hr)を投与
悪性リンパ腫	3 モガムリズマブ weekly	ポテリジオ 1mg/kg (120分) day1	7日	皮膚T細胞性リンパ腫は、5回Weekly投与後にbi-weeklyレジメンになる
悪性リンパ腫	4 Brentuximab vedotin	アドセトリス 1.8mg/kg (60分) day1	21日	

【診療科:皮膚科】

がん種	レジメン名	レジメン内容	インターバル	注意事項
悪性リンパ腫	5 A+CHP	ドキシソルピシン 50mg/m ² (30分) day1 エンドキサン 750mg/m ² (30分) day1 アドセトリス 1.8mg/kg (30分) day1 プレドニン 100mg/body (内服) day1-5	21日	末梢性T細胞リンパ腫
メルケル細胞癌	1 アベルマブ	パベンチオ 10mg/kg (60分) day1	14日	
乳房外Paget病	1 DOC weekly	ドセタキセル 25mg/m ² (120分) day1	7日	
乳房外Paget病	2 S-1+DOC (monthly)	ドセタキセル 40mg/m ² (2時間) day1 エスワンタイホウ 40mg/m ² × 2 day1-14	28日	