

【診療科:血液・腫瘍内科】

がん種	レジメン名	レジメン内容	インターバル	注意事項
非ホジキンリンパ腫	1 リツキシマブ	リツキサンまたはリツキシマブBS 375mg/m ² (注意事項参照) day1	7日	最大8コース [1コース目] 50mL/hで開始、30分毎に50mL/hずつ速度を上げ、最大400mL/hまで [2コース目以降] 100mL/hで開始、30分毎に100mL/hずつ速度を上げ、最大400mL/hまで [2コース目以降] 臨床的に重篤な心疾患がなく、初回投与時に発現した副作用が軽微であり、かつ投与前の末梢血リンパ球数が5000/ μ L未満である場合、90分間で投与することができる。最初の30分で投与量の20% (100mL/hr)、その後60分で投与量の80% (200mL/hr)を投与
非ホジキンリンパ腫	2 リツキシマブ維持	リツキサンまたはリツキシマブBS 375mg/m ² (注意事項参照) day1	56日	最大12コース [1コース目] 50mL/hで開始、30分毎に50mL/hずつ速度を上げ、最大400mL/hまで [2コース目以降] 100mL/hで開始、30分毎に100mL/hずつ速度を上げ、最大400mL/hまで [2コース目以降] 臨床的に重篤な心疾患がなく、初回投与時に発現した副作用が軽微であり、かつ投与前の末梢血リンパ球数が5000/ μ L未満である場合、90分間で投与することができる。最初の30分で投与量の20% (100mL/hr)、その後60分で投与量の80% (200mL/hr)を投与
非ホジキンリンパ腫	3 CHOP	オンコビン1.4mg/m ² (10分) day1 ドキシルビシン 50mg/m ² (30分) day1 エンドキサン 750mg/m ² (2時間) day1 プレドニン 100mg/body (内服) day1-5	21日	最大8コース
非ホジキンリンパ腫	4 R-CHOP	リツキサンまたはリツキシマブBS 375mg/m ² (注意事項参照) day1 オンコビン 1.4mg/m ² (10分) day1 ドキシルビシン 50mg/m ² (30分) day1 エンドキサン 750mg/m ² (2時間) day1 プレドニン 100mg/body (内服) day1-5	21日	最大8コース リツキサンまたはリツキシマブBS [1コース目] 50mL/hで開始、30分毎に50mL/hずつ速度を上げ、最大400mL/hまで [2コース目以降] 100mL/hで開始、30分毎に100mL/hずつ速度を上げ、最大400mL/hまで [2コース目以降] 臨床的に重篤な心疾患がなく、初回投与時に発現した副作用が軽微であり、かつ投与前の末梢血リンパ球数が5000/ μ L未満である場合、90分間で投与することができる。最初の30分で投与量の20% (100mL/hr)、その後60分で投与量の80% (200mL/hr)を投与
非ホジキンリンパ腫	5 CVP	オンコビン1.4mg/m ² (10分) day1 エンドキサン 750mg/m ² (2時間) day1 プレドニン 100mg/body (内服) day1-5	21日	最大8コース
非ホジキンリンパ腫	6 R-CVP	リツキサンまたはリツキシマブBS 375mg/m ² (注意事項参照) day1 オンコビン 1.4mg/m ² (10分) day1 エンドキサン 750mg/m ² (2時間) day1 プレドニン 100mg/body (内服) day1-5	21日	最大8コース リツキサンまたはリツキシマブBS [1コース目] 50mL/hで開始、30分毎に50mL/hずつ速度を上げ、最大400mL/hまで [2コース目以降] 100mL/hで開始、30分毎に100mL/hずつ速度を上げ、最大400mL/hまで [2コース目以降] 臨床的に重篤な心疾患がなく、初回投与時に発現した副作用が軽微であり、かつ投与前の末梢血リンパ球数が5000/ μ L未満である場合、90分間で投与することができる。最初の30分で投与量の20% (100mL/hr)、その後60分で投与量の80% (200mL/hr)を投与

【診療科:血液・腫瘍内科】

がん種	レジメン名	レジメン内容	インターバル	注意事項
非ホジキンリンパ腫	7 THP-GOP(標準量)	オンコビン 1.4mg/m ² (10分) day1 テラルピシシ 50mg/m ² (30分) day1 エンドキサシ 750mg/m ² (2時間) day1 プレドニン 100mg/body (内服) day1-5	21日	
非ホジキンリンパ腫	8 R-THP-GOP(標準量)	リツキサシまたはリツキシマブBS 375mg/m ² (注意事項参照) day1 オンコビン 1.4mg/m ² (10分) day1 テラルピシシ 50mg/m ² (30分) day1 エンドキサシ 750mg/m ² (2時間) day1 プレドニン 100mg/body (内服) day1-5	21日	リツキサシまたはリツキシマブBS [1コース目] 50mL/hで開始、30分毎に50mL/hずつ速度を上げ、最大400mL/hまで [2コース目以降] 100mL/hで開始、30分毎に100mL/hずつ速度を上げ、最大400mL/hまで [2コース目以降] 臨床的に重篤な心疾患がなく、初回投与時に発現した副作用が軽微であり、かつ投与前の末梢血リンパ球数が5000/ μ L未満である場合、90分間で投与することができる。最初の30分で投与量の20% (100mL/hr)、その後60分で投与量の80% (200mL/hr)を投与
非ホジキンリンパ腫	9 THP-GOP(減量)	オンコビン 1mg/m ² (10分) day1 テラルピシシ 40mg/m ² (30分) day1 エンドキサシ 600mg/m ² (2時間) day1 プレドニン 80mg/body (内服) day1-5	21日	
非ホジキンリンパ腫	10 R-THP-GOP(減量)	リツキサシまたはリツキシマブBS 375mg/m ² (注意事項参照) day1 オンコビン 1mg/m ² (10分) day1 テラルピシシ 40mg/m ² (30分) day1 エンドキサシ 600mg/m ² (2時間) day1 プレドニン 80mg/body (内服) day1-5	21日	リツキサシまたはリツキシマブBS [1コース目] 50mL/hで開始、30分毎に50mL/hずつ速度を上げ、最大400mL/hまで [2コース目以降] 100mL/hで開始、30分毎に100mL/hずつ速度を上げ、最大400mL/hまで [2コース目以降] 臨床的に重篤な心疾患がなく、初回投与時に発現した副作用が軽微であり、かつ投与前の末梢血リンパ球数が5000/ μ L未満である場合、90分間で投与することができる。最初の30分で投与量の20% (100mL/hr)、その後60分で投与量の80% (200mL/hr)を投与
非ホジキンリンパ腫	11 Pola-R-CHP	リツキシマブ 375mg/m ² (注意事項参照) day1 ポライビー 1.8mg/kg (90分) day1 ドキシソルピシシ 50mg/m ² (30分) day1 エンドキサシ 750mg/m ² (30分) day1 プレドニン 100mg/body (内服) day1-5	21日	リツキサシまたはリツキシマブBS [1コース目] 50mL/hで開始、30分毎に50mL/hずつ速度を上げ、最大400mL/hまで [2コース目以降] 100mL/hで開始、30分毎に100mL/hずつ速度を上げ、最大400mL/hまで [2コース目以降] 臨床的に重篤な心疾患がなく、初回投与時に発現した副作用が軽微であり、かつ投与前の末梢血リンパ球数が5000/ μ L未満である場合、90分間で投与することができる。最初の30分で投与量の20% (100mL/hr)、その後60分で投与量の80% (200mL/hr)を投与 ポライビー 1回目90分、2回目以降30分

【診療科:血液・腫瘍内科】

がん種	レジメン名	レジメン内容	インターバル	注意事項
非ホジキンリンパ腫	12 R2	リツキサンまたはリツキシマブBS 375mg/m2 (注意事項参照) 1コース目 day1,8,15,22 2コース目以降 day1 (最大5コース) レブラミド20mg/日(連日) day1-21 (最大12コース)	28日	リツキサンまたはリツキシマブBS [1コース目] 50mL/hで開始、30分毎に50mL/hずつ速度を上げ、最大400mL/hまで [2コース目以降] 100mL/hで開始、30分毎に100mL/hずつ速度を上げ、最大400mL/hまで [2コース目以降] 臨床的に重篤な心疾患がなく、初回投与時に発現した副作用が軽微であり、かつ投与前の末梢血リンパ球数が5000/μL未満である場合、90分間で投与することができる。最初の30分で投与量の20%(100mL/hr)、その後60分で投与量の80%(200mL/hr)を投与
非ホジキンリンパ腫	13 R-B (day1-2) (低悪性度B細胞性非ホジキンリンパ腫、マントル細胞リンパ腫)	リツキサンまたはリツキシマブBS 375mg/m2 (注意事項参照) day1 トリアキシン 90mg/m2 (1時間) day1,2	28日	リツキサンまたはリツキシマブBS [1コース目] 50mL/hで開始、30分毎に50mL/hずつ速度を上げ、最大400mL/hまで [2コース目以降] 100mL/hで開始、30分毎に100mL/hずつ速度を上げ、最大400mL/hまで [2コース目以降] 臨床的に重篤な心疾患がなく、初回投与時に発現した副作用が軽微であり、かつ投与前の末梢血リンパ球数が5000/μL未満である場合、90分間で投与することができる。最初の30分で投与量の20%(100mL/hr)、その後60分で投与量の80%(200mL/hr)を投与
非ホジキンリンパ腫	14 R-B (day1-3) (低悪性度B細胞性非ホジキンリンパ腫、マントル細胞リンパ腫)	リツキサンまたはリツキシマブBS 375mg/m2 (注意事項参照) day1 トリアキシン 90mg/m2 (1時間) day2,3	28日	リツキサンまたはリツキシマブBS [1コース目] 1日1回 点滴静注 50mL/hで開始、30分毎に50mL/hずつ速度を上げ、最大400mL/hまで [2コース目以降] 1日1回 点滴静注 100mL/hで開始、30分毎に100mL/hずつ速度を上げ、最大400mL/hまで [2コース目以降] 臨床的に重篤な心疾患がなく、初回投与時に発現した副作用が軽微であり、かつ投与前の末梢血リンパ球数が5000/μL未満である場合、90分間で投与することができる。最初の30分で投与量の20%(100mL/hr)、その後60分で投与量の80%(200mL/hr)を投与
非ホジキンリンパ腫	15 R-B (day1-2) (びまん性大細胞型B細胞リンパ腫)	リツキサンまたはリツキシマブBS 375mg/m2 (注意事項参照) day1 トリアキシン 120mg/m2 (1時間) day1,2	21日	最大6コース リツキサンまたはリツキシマブBS [1コース目] 50mL/hで開始、30分毎に50mL/hずつ速度を上げ、最大400mL/hまで [2コース目以降] 100mL/hで開始、30分毎に100mL/hずつ速度を上げ、最大400mL/hまで [2コース目以降] 臨床的に重篤な心疾患がなく、初回投与時に発現した副作用が軽微であり、かつ投与前の末梢血リンパ球数が5000/μL未満である場合、90分間で投与することができる。最初の30分で投与量の20%(100mL/hr)、その後60分で投与量の80%(200mL/hr)を投与
非ホジキンリンパ腫	16 R-B (day1-3) (びまん性大細胞型B細胞リンパ腫)	リツキサンまたはリツキシマブBS 375mg/m2 (注意事項参照) day1 トリアキシン 120mg/m2 (1時間) day2,3	21日	最大6コース リツキサンまたはリツキシマブBS [1コース目] 50mL/hで開始、30分毎に50mL/hずつ速度を上げ、最大400mL/hまで [2コース目以降] 100mL/hで開始、30分毎に100mL/hずつ速度を上げ、最大400mL/hまで [2コース目以降] 臨床的に重篤な心疾患がなく、初回投与時に発現した副作用が軽微であり、かつ投与前の末梢血リンパ球数が5000/μL未満である場合、90分間で投与することができる。最初の30分で投与量の20%(100mL/hr)、その後60分で投与量の80%(200mL/hr)を投与
非ホジキンリンパ腫	17 ベンダムスチン	トリアキシン 120mg/m2 (1時間) day1,2	21日	

【診療科:血液・腫瘍内科】

がん種	レジメン名	レジメン内容	インターバル	注意事項
非ホジキンリンパ腫	18 Pola-R-B cycle1	リツキサンまたはリツキシマブBS 375mg/m ² (注意事項参照) day1 ボライビー 1.8mg/kg (90分) day2 トリアキシン 90mg/m ² (1時間) day2,3	21日	リツキサンまたはリツキシマブBS [1コース目] 50mL/hで開始、30分毎に50mL/hずつ速度を上げ、最大400mL/hまで [2コース目以降] 100mL/hで開始、30分毎に100mL/hずつ速度を上げ、最大400mL/hまで [2コース目以降] 臨床的に重篤な心疾患がなく、初回投与時に発現した副作用が軽微であり、かつ投与前の末梢血リンパ球数が5000/ μ L未満である場合、90分間で投与することができる。最初の30分で投与量の20% (100mL/hr)、その後60分で投与量の80% (200mL/hr)を投与 ボライビー 1回目90分、2回目を以降30分
非ホジキンリンパ腫	19 Pola-R-B cycle2-6	リツキサンまたはリツキシマブBS 375mg/m ² (注意事項参照) day1 ボライビー 1.8mg/kg (90分) day1 トリアキシン 90mg/m ² (1時間) day1,2	21日	リツキサンまたはリツキシマブBS [1コース目] 50mL/hで開始、30分毎に50mL/hずつ速度を上げ、最大400mL/hまで [2コース目以降] 100mL/hで開始、30分毎に100mL/hずつ速度を上げ、最大400mL/hまで [2コース目以降] 臨床的に重篤な心疾患がなく、初回投与時に発現した副作用が軽微であり、かつ投与前の末梢血リンパ球数が5000/ μ L未満である場合、90分間で投与することができる。最初の30分で投与量の20% (100mL/hr)、その後60分で投与量の80% (200mL/hr)を投与 ボライビー 1回目90分、2回目を以降30分
非ホジキンリンパ腫	20 G-CHOP	ガザイバ 1000mg/body (注意事項参照) 1コース目 day1,8,15、2コース目以降day1 オンコビン 1.4mg/m ² (10分) day1 ドキシソルピシン 50mg/m ² (30分) day1 エンドキサン 750mg/m ² (2時間) day1 プレドニン 100mg/body day1-5	21日	最大8コース ガザイバ [初回] 12.5mL/hで開始、30分毎に12.5mL/hずつ速度を上げ、最大100mL/hまで [2回目以降]前回の投与でGrade2以上のinfusion reactionが発現しなかった場合 25mL/hで投与を開始、30分毎に25mL/hずつ、最大100mL/hまで [2コース目以降]第1サイクルの投与でGrade 3以上のinfusion reactionが発現しなかった場合 最初の30分は25mL/hrで開始、その後最大225mL/hrまで上げることができる
非ホジキンリンパ腫	21 G-B (day1-2)	ガザイバ 1000mg/body (注意事項参照) 1コース目 day1,8,15、2コース目以降day1 トリアキシン 90mg/m ² (1時間) day1,2	28日	最大6コース ガザイバ [初回] 12.5mL/hで開始、30分毎に12.5mL/hずつ速度を上げ、最大100mL/hまで [2回目以降]前回の投与でGrade2以上のinfusion reactionが発現しなかった場合 25mL/hで投与を開始、30分毎に25mL/hずつ、最大100mL/hまで [2コース目以降]第1サイクルの投与でGrade 3以上のinfusion reactionが発現しなかった場合 最初の30分は25mL/hrで開始、その後最大225mL/hrまで上げることができる
非ホジキンリンパ腫	22 G-B (day1-3)	ガザイバ 1000mg/body (注意事項参照) 1コース目 day1,8,15、2コース目以降day1 トリアキシン 90mg/m ² (1時間) day2,3	28日	最大6コース ガザイバ [初回] 12.5mL/hで開始、30分毎に12.5mL/hずつ速度を上げ、最大100mL/hまで [2回目以降]前回の投与でGrade2以上のinfusion reactionが発現しなかった場合 25mL/hで投与を開始、30分毎に25mL/hずつ、最大100mL/hまで [2コース目以降]第1サイクルの投与でGrade 3以上のinfusion reactionが発現しなかった場合 最初の30分は25mL/hrで開始、その後最大225mL/hrまで上げることができる

【診療科:血液・腫瘍内科】

がん種	レジメン名	レジメン内容	インターバル	注意事項
非ホジキンリンパ腫	23 ガザイバ維持	ガザイバ 1000mg/body (注意事項参照)day1	56日	最大12コース [初回] 12.5mL/hで開始、30分毎に12.5mL/hずつ速度を上げ、最大100mL/hまで [2回目以降]前回の投与でGrade2以上のinfusion reactionが発現しなかった場合 25mL/hで投与を開始、30分毎に25mL/hずつ、最大100mL/hまで [2コース目以降]第1サイクルの投与でGrade 3以上のinfusion reactionが発現しなかった場合 最初の30分は25mL/hrで開始、その後最大225mL/hrまで上げることができる
非ホジキンリンパ腫	24 OPT-11	イリノテカン 40mg/m2 (1時間) day1,2,3	7日	2週毎または3週毎の場合もある
非ホジキンリンパ腫	25 エプコリタマブ cycle1	エプキンリ 0.16mg/body (皮下注) day1 エプキンリ 0.8mg/body (皮下注) day8 エプキンリ 48mg/body (皮下注) day15,22	28日	
非ホジキンリンパ腫	26 エプコリタマブ cycle2,3	エプキンリ 48mg/body (皮下注) day1,8,15,22	28日	
非ホジキンリンパ腫	27 エプコリタマブ cycle4-9	エプキンリ 48mg/body (皮下注) day1,15	28日	
非ホジキンリンパ腫	28 エプコリタマブ cycle10以降	エプキンリ 48mg/body (皮下注) day1	28日	

【診療科:血液・腫瘍内科】

がん種		レジメン名	レジメン内容	インターバル	注意事項
末梢性T細胞リンパ腫	29	A+GHP	ドキシソルビシン 50mg/m ² (30分) day1 エンドキサン 750mg/m ² (30分) day1 アドセトリス 1.8mg/kg (30分) day1 プレドニン 100mg/body(内服) day1-5	21日	最大8コース
末梢性T細胞リンパ腫	30	ロミデプシン	イストダックス 14mg/m ² (4時間) day1,8,15	28日	
末梢性T細胞リンパ腫	31	プララトレキサート	ジフォルタ 30mg/m ² (5分) day1,8,15,22,29,36	49日	
末梢性T細胞リンパ腫	32	デニロイキン ジフチクス	レミトロ 9μg/kg(1時間) day1,2,3,4,5	21日	
末梢性T細胞リンパ腫	33	ダリナバルシン	ダルビアス 300mg/m ² (1時間) day1-5	21日	
ホジキンリンパ腫 末梢性T細胞リンパ腫	34	ブレンツキシマブベドチン	アドセトリス 1.8mg/kg (1時間) day1	21日	

【診療科:血液・腫瘍内科】

がん種		レジメン名	レジメン内容	インターバル	注意事項
ホジキンリンパ腫	35	ABVD	エクザール 6mg/m ² (10分) day1,15 ドキシルビシン 25mg/m ² (30分) day1,15 プレオ 10mg/m ² (30分) day1,15 ダカルバジン 375mg/m ² (30分) day1,15	28日	6-8コース
ホジキンリンパ腫	36	A-AVD	エクザール 6mg/m ² (10分) day1,15 ドキシルビシン 25mg/m ² (30分) day1,15 ダカルバジン 375mg/m ² (30分) day1,15 アドセトリス 1.2mg/kg (30分) day1,15	28日	最大6コース(12回)
ホジキンリンパ腫	37	Nivolumab	オプジーボ 240mg/body (30分) day1	14日	
ホジキンリンパ腫	38	Nivolumab(4週)	オプジーボ 480mg/body (30分) day1	28日	
ホジキンリンパ腫	39	Pembrolizumab	キイトルーダ 200mg/body (30分) day1	21日	
ホジキンリンパ腫	40	Pembrolizumab(6週)	キイトルーダ 400mg/body (30分) day1	42日	

【診療科:血液・腫瘍内科】

がん種		レジメン名	レジメン内容	インターバル	注意事項
骨髄異形成症候群	1	アザシチジン	ビダーザ 75mg/m ² (10分点滴または皮下注) day1,2,3,4,5,6,7	28日	
多発性骨髄腫	1	BD(2回/週)	ボルテゾミブ 1.3mg/m ² (皮下注または緩徐に静注) day1,4,8,11 レナデックス 20mg/body (内服) day1,2,4,5,8,9,11,12	21日	
多発性骨髄腫	2	BD(1回/週)	ボルテゾミブ 1.3mg/m ² (皮下注または緩徐に静注) day1,8,15,22 レナデックス 20mg/body (内服) day1,2,8,9,15,16,22,23	35日	
多発性骨髄腫	3	BLd	ボルテゾミブ 1.3mg/m ² (皮下注または緩徐に静注) day1,4,8,11 レブラミド 25mg/body (内服) day1-14 レナデックス 20mg/body (内服) day1,2,4,5,8,9,11,12	21日	
多発性骨髄腫	4	BLd lite cycle1-9	ボルテゾミブ 1.3mg/m ² (皮下注または緩徐に静注) day1,8,15,22 レブラミド 15mg/body (内服) day1-21 レナデックス 20mg/body (内服) day1,2,8,9,15,16,22,23	35日	75歳超の場合、レナデックスは20mg/body day1,8,15,22
多発性骨髄腫	5	BLd lite cycle10以降	ボルテゾミブ 1.3mg/m ² (皮下注または緩徐に静注) day1,15 レブラミド 15mg/body (内服) day1-21	28日	

【診療科:血液・腫瘍内科】

がん種		レジメン名	レジメン内容	インターバル	注意事項
多発性骨髄腫	6	CyBorD	エンドキサン 300mg/m ² (2時間) day1,8,15,22 ボルテゾミブ 1.3mg/m ² (皮下注) day1,8,15,22 レナデックス 40mg/body (内服) day1,8,15,22	28日	
多発性骨髄腫	7	Kd cycle1	カイプロリス 20mg/m ² (30分) day,1,2 カイプロリス 56mg/m ² (30分) day8,9,15,16 レナデックス 20mg/body (内服) day1,2,8,9,15,16,22,23	28日	
多発性骨髄腫	8	Kd cycle2以降	カイプロリス 56mg/m ² (30分) day1,2,8,9,15,16 レナデックス 20mg/body (内服) day1,2,8,9,15,16,22,23	28日	
多発性骨髄腫	9	Kd 週1回 cycle1	カイプロリス 20mg/m ² (30分) day,1 カイプロリス 70mg/m ² (30分) day8,15 レナデックス 40mg/body (内服) day1,8,15,22	28日	
多発性骨髄腫	10	Kd 週1回 cycle2以降	カイプロリス 70mg/m ² (30分) day1,8,15 レナデックス 40mg/body (内服) day1,8,15,22	28日	
多発性骨髄腫	11	KRd cycle1	カイプロリス 20mg/m ² (10分) day1,2, カイプロリス 27mg/m ² (10分) day8,9,15,16 レナデックス 40mg/body (内服) day1,8,15,22 レブラミド 25mg/body (内服) day1-21	28日	

【診療科:血液・腫瘍内科】

がん種	レジメン名	レジメン内容	インターバル	注意事項
多発性骨髄腫	12 KRd cycle2-12	カイプロリス 27mg/m ² (10分) day1,2,8,9,15,16 レナデックス 40mg/body (内服) day1,8,15,22 レブラミド 25mg/body (内服) day1-21	28日	
多発性骨髄腫	13 KRd cycle13以降	カイプロリス 27mg/m ² (10分) day1,2,15,16 レナデックス 40mg/body (内服) day1,8,15,22 レブラミド 25mg/body (内服) day1-21	28日	
多発性骨髄腫	14 ELd 1,2cycle	エムブリシティ 10mg/kg (注意事項参照) day1,8,15,22 レナデックス 28mg/body (内服) day1,8,15,22 レブラミド 25mg/body (内服) day1-21 デキサート 6.6mg/body day1,8,15,22	28日	エムブリシティ [1コース目 day1] 30mL/hで開始、開始30分後に60mL/h、開始1時間後に120mL/h [1コース目 day8] 180mL/hで開始、開始30分後に240mL/h [1コース目 day15、22、2コース目] 300mL/h
多発性骨髄腫	15 ELd 3cycle以降	エムブリシティ 10mg/kg (300mL/h) day1,15 レナデックス 28mg/body (内服) day1,15 レナデックス 40mg/body (内服) day8,22 レブラミド 25mg/body (内服) day1-21 デキサート 6.6mg/body day1,15	28日	
多発性骨髄腫	16 EPd 1,2cycle	エムブリシティ 10mg/kg (注意事項参照) day1,8,15,22 レナデックス 28mg/body (内服) day1,8,15,22 ボマリスト 4mg/body (内服) day1-21 デキサート 6.6mg/body day1,8,15,22	28日	エムブリシティ [1コース目 day1] 30mL/hで開始、開始30分後に60mL/h、開始1時間後に120mL/h [1コース目 day8] 180mL/hで開始、開始30分後に240mL/h [1コース目 day15、22、2コース目] 300mL/h ※75歳を超える場合は、レナデックスは8mg
多発性骨髄腫	17 EPd 3cycle以降	エムブリシティ 20mg/kg (注意事項参照) day1 レナデックス 28mg/body (内服) day1 レナデックス 40mg/body (内服) day8,15,22 ボマリスト 4mg/body (内服) day1-21 デキサート 6.6mg/body day1	28日	エムブリシティ [3コース目] 180mL/hで開始、開始30分後に240mL/h [4コース目以降] 300mL/h ※75歳を超える場合は、レナデックスは8mg(day1),20mg(day8,15,22)

【診療科:血液・腫瘍内科】

がん種	レジメン名	レジメン内容	インターバル	注意事項
多発性骨髄腫	18 DBd cycle1-3	ボルテゾミブ 1.3mg/m ² (緩徐に静注) day1,4,8,11 ダラザレックス 16mg/kg (注意事項参照) day1,8,15 デキサート 19.8mg/body day1,8,15 レナデックス 20mg/body (内服) day2,4,5,9,11,12	21日	ダラザレックス [1コース目 day1,8] 50mL/hで開始、1時間毎に50mL/hずつ速度を上げ、最大200mL/hまで [1コース目 day15、2コース目以降] 100mL/hで開始、1時間毎に50mL/hずつ速度を上げ、最大200mL/hまで 75歳を超える、過小体重(BMI<18.5)、コントロール不良の糖尿病、又はステロイド療法に対する忍容性がない若しくは有害事象を発現した患者の場合は、レナデックス20mg/週で投与可
多発性骨髄腫	19 DBd cycle4-8	ボルテゾミブ 1.3mg/m ² (緩徐に静注) day1,4,8,11 ダラザレックス 16mg/kg (注意事項参照) day1 デキサート 19.8mg/body day1 レナデックス 20mg/body (内服) day2,4,5,8,9,11,12	21日	ダラザレックス 100mL/hで開始、1時間毎に50mL/hずつ速度を上げ、最大200mL/hまで 75歳を超える、過小体重(BMI<18.5)、コントロール不良の糖尿病、又はステロイド療法に対する忍容性がない若しくは有害事象を発現した患者の場合は、レナデックス20mg/週で投与可
多発性骨髄腫	20 DBd cycle9以降	ダラザレックス 16mg/kg (注意事項参照) day1 デキサート19.8mg/body day1	28日	ダラザレックス 100mL/hで開始、1時間毎に50mL/hずつ速度を上げ、最大200mL/hまで
多発性骨髄腫	21 DBd皮下注 cycle1-3	ボルテゾミブ 1.3mg/m ² (皮下注) day1,4,8,11 ダラキューロ 1800mg (皮下注) day1,8,15 レナデックス 20mg/body (内服) day1,2,4,5,8,9,11,12,15	21日	75歳を超える、過小体重(BMI<18.5)、コントロール不良の糖尿病、又はステロイド療法に対する忍容性がない若しくは有害事象を発現した患者の場合は、レナデックス20mg/週へ減量可能
多発性骨髄腫	22 DBd皮下注 cycle4-8	ボルテゾミブ 1.3mg/m ² (皮下注) day1,4,8,11 ダラキューロ 1800mg (皮下注) day1 レナデックス 20mg/body (内服) day1,2,4,5,8,9,11,12	21日	75歳を超える、過小体重(BMI<18.5)、コントロール不良の糖尿病、又はステロイド療法に対する忍容性がない若しくは有害事象を発現した患者の場合は、レナデックス20mg/週へ減量可能
多発性骨髄腫	23 DBd皮下注 cycle9以降	ダラキューロ 1800mg (皮下注) day1 レナデックス 20mg/body (内服) day1	28日	75歳を超える、過小体重(BMI<18.5)、コントロール不良の糖尿病、又はステロイド療法に対する忍容性がない若しくは有害事象を発現した患者の場合は、レナデックス20mg/週へ減量可能

【診療科:血液・腫瘍内科】

がん種	レジメン名	レジメン内容	インターバル	注意事項
多発性骨髄腫	24 DLd cycle1-2	ダラザレックス 16mg/kg (注意事項参照) day,1,8,15,22 デキサート 19.8mg day1,8,15,22 レナデックス 20mg/body (内服) day2,9,16,23 レブラミド 25mg/body (内服) day1-21	28日	ダラザレックス [1コース目 day1,8] 50mL/hで開始、1時間毎に50mL/hずつ速度を上げ、最大200mL/hまで [1コース目 day15,22、2コース目] 100mL/hで開始、1時間毎に50mL/hずつ速度を上げ、最大200mL/hまで 75歳を超える、過小体重(BMI<18.5)患者の場合は、レナデックス20mg/週へ減量可能
多発性骨髄腫	25 DLd cycle3-6	ダラザレックス 16mg/kg (注意事項参照) day,1,15 デキサート 19.8mg day1,15 レナデックス 20mg/body (内服) day2,16 レナデックス 40mg/body (内服) day8,22 レブラミド 25mg/body (内服) day1-21	28日	ダラザレックス 100mL/hで開始、1時間毎に50mL/hずつ速度を上げ、最大200mL/hまで 75歳を超える、過小体重(BMI<18.5)患者の場合は、レナデックス20mg/週へ減量可能
多発性骨髄腫	26 DLd cycle7以降	ダラザレックス 16mg/kg (注意事項参照) day,1 デキサート 19.8mg day1 レナデックス 20mg/body (内服) day2 レナデックス 40mg/body (内服) day8,22 レブラミド 25mg/body (内服) day1-21	28日	ダラザレックス 100mL/hで開始、1時間毎に50mL/hずつ速度を上げ、最大200mL/hまで 75歳を超える、過小体重(BMI<18.5)患者の場合は、レナデックス20mg/週へ減量可能
多発性骨髄腫	27 DLd皮下注 cycle1-2	ダラキューロ 1800mg (皮下注) day1,8,15,22 レナデックス 20mg/body (内服) day1,2,8,9,15,16,22,23 レブラミド 25mg/body (内服) day1-21	28日	75歳を超える、過小体重(BMI<18.5)患者の場合は、レナデックス20mg/週へ減量可能
多発性骨髄腫	28 DLd皮下注 cycle3-6	ダラキューロ 1800mg (皮下注) day1,15 レナデックス 20mg/body (内服) day1,2,15,16 レナデックス 40mg/body (内服) day8,22 レブラミド 25mg/body (内服) day1-21	28日	75歳を超える、過小体重(BMI<18.5)患者の場合は、レナデックス20mg/週へ減量可能
多発性骨髄腫	29 DLd皮下注 cycle7以降	ダラキューロ 1800mg (皮下注) day1 レナデックス 20mg/body (内服) day1,2 レナデックス 40mg/body (内服) day8,15,22 レブラミド 25mg/body (内服) day1-21	28日	75歳を超える、過小体重(BMI<18.5)患者の場合は、レナデックス20mg/週へ減量可能

【診療科:血液・腫瘍内科】

がん種	レジメン名	レジメン内容	インターバル	注意事項
多発性骨髄腫	30 DMPB cycle1	ボルテゾミブ 1.3mg/m ² (皮下注) day1,4,8,11,22,25,29,32 ダラザレックス 16mg/kg (注意事項参照) day1,8,15,22,29,36 アルケランp.o 9mg/m ² (内服) day1-4 ブレドニンp.o 60mg/m ² (内服) day2-4 デキサート19.8mg/body day1,8,15,22,29,36	42日	ダラザレックス [1コース目 day1,8] 50mL/hで開始、1時間毎に50mL/hずつ速度を上げ、最大200mL/hまで [1コース目 day15以降] 100mL/hで開始、1時間毎に50mL/hずつ速度を上げ、最大200mL/hまで
多発性骨髄腫	31 DMPB cycle2-9	ボルテゾミブ 1.3mg/m ² (皮下注) day1,8,22,29 ダラザレックス 16mg/kg (注意事項参照) day1,22 アルケランp.o 9mg/m ² (内服) day1-4 ブレドニンp.o 60mg/m ² (内服) day2-4 デキサート19.8mg/body day1,22	42日	ダラザレックス 100mL/hで開始、1時間毎に50mL/hずつ速度を上げ、最大200mL/hまで
多発性骨髄腫	32 DMPB cycle10以降	ダラザレックス 16mg/kg (注意事項参照) day1 デキサート19.8mg/body day1	28日	ダラザレックス 100mL/hで開始、1時間毎に50mL/hずつ速度を上げ、最大200mL/hまで
多発性骨髄腫	33 DMPB皮下注 cycle1	ボルテゾミブ 1.3mg/m ² (皮下注) day1,4,8,11,22,25,29,32 ダラキューロ 1800mg (皮下注) day1,8,15,22,29,36 アルケランp.o 9mg/m ² (内服) day1-4 ブレドニンp.o 60mg/m ² (内服) day2-4 レナデックス20mg/body (内服) day1,8,15,22,29,36	42日	
多発性骨髄腫	34 DMPB皮下注 cycle2-9	ボルテゾミブ 1.3mg/m ² (皮下注) day1,8,22,29 ダラキューロ 1800mg (皮下注) day1,22 アルケランp.o 9mg/m ² (内服) day1-4 ブレドニンp.o 60mg/m ² (内服) day2-4 レナデックス20mg/body (内服) day1,22	42日	
多発性骨髄腫	35 DMPB皮下注 cycle10以降	ダラキューロ 1800mg (皮下注) day1 レナデックス20mg/body (内服) day1	28日	

【診療科:血液・腫瘍内科】

がん種	レジメン名	レジメン内容	インターバル	注意事項
多発性骨髄腫	36 DCd cycle1	カイプロリス 20mg/m ² (30分) day1,2 カイプロリス 56mg/m ² (30分) day8,9,15,16 ダラザレックス 16mg/kg (50mL/hr) day1,8,15,22 デキサート 19.8mg/body (30分) day1,2,8,9,15,16 デキサート 39.6mg/body (60分) day22	28日	75歳を超える場合 デキサート 19.8mg/body (30分) day1,2,8,15 デキサート 8.25mg/body (30分) day2,9,16 デキサート 19.8mg/body (60分) day22
多発性骨髄腫	37 DCd cycle2	カイプロリス 56mg/m ² (30分) day1,2,8,9,15,16 ダラザレックス 16mg/kg (50mL/hr) day1,8,15,22 デキサート 19.8mg/body (30分) day1,2,8,9,15,16 デキサート 39.6mg/body (60分) day22	28日	75歳を超える場合 デキサート 19.8mg/body (30分) day1,8,15 デキサート 19.8mg/body (60分) day22
多発性骨髄腫	38 DCd cycle3-6	カイプロリス 56mg/m ² (30分) day1,2,8,9,15,16 ダラザレックス 16mg/kg (50mL/hr) day1,15 デキサート 19.8mg/body (30分) day1,2,8,9,15,16 レナデックス 40mg/body (内服) day22	28日	75歳を超える場合 デキサート 19.8mg/body (30分) day1,15 デキサート 11.55mg/body (30分) day8 デキサート 8.25mg/body (30分) day9 レナデックス 20mg/body (内服) day22
多発性骨髄腫	39 DCd cycle7以降	カイプロリス 56mg/m ² (30分) day1,2,8,9,15,16 ダラザレックス 16mg/kg (50mL/hr) day1,15 デキサート 19.8mg/body (30分) day1,2,8,9,15,16 レナデックス 40mg/body (内服) day22	28日	75歳を超える場合 デキサート 19.8mg/body (30分) day1 デキサート 11.55mg/body (30分) day8,15 デキサート 8.25mg/body (30分) day9,16 レナデックス 20mg/body (内服) day22
多発性骨髄腫	40 DCd皮下注 cycle1	カイプロリス 20mg/m ² (30分) day1,2 カイプロリス 56mg/m ² (30分) day8,9,15,16 ダラキューロ 1800mg (皮下注) day1,8,15,22 デキサート 19.8mg/body (30分) day1,2,8,9,15,16 レナデックス 40mg/body (内服) day22	28日	75歳を超える場合 デキサート 19.8mg/body (30分) day1,2,8,15 レナデックス 20mg/body (内服) day22
多発性骨髄腫	41 DCd皮下注 cycle2	カイプロリス 56mg/m ² (30分) day1,2,8,9,15,16 ダラキューロ 1800mg (皮下注) day1,8,15,22 デキサート 19.8mg/body (30分) day1,2,8,9,15,16 レナデックス 40mg/body (内服) day22	28日	75歳を超える場合 デキサート 19.8mg/body (30分) day1,8,15 レナデックス 20mg/body (内服) day22

【診療科:血液・腫瘍内科】

がん種	レジメン名	レジメン内容	インターバル	注意事項
多発性骨髄腫	42 DCd皮下注 cycle3-6	カイプロリス 56mg/m ² (30分) day1,2,8,9,15,16 ダラキューロ 1800mg (皮下注) day1,15 デキサート 19.8mg/body (30分) day1,2,8,9,15,16 レナデックス 40mg/body (内服) day22	28日	75歳を超える場合 デキサート 19.8mg/body (30分) day1,15 デキサート 11.55mg/body (30分) day8 デキサート 8.25mg/body (30分) day9 レナデックス 20mg/body (内服) day22
多発性骨髄腫	43 DCd皮下注 cycle7以降	カイプロリス 56mg/m ² (30分) day1,2,8,9,15,16 ダラキューロ 1800mg (皮下注) day1 デキサート 19.8mg/body (30分) day1,2,8,9,15,16 レナデックス 40mg/body (内服) day22	28日	75歳を超える場合 デキサート 19.8mg/body (30分) day1 デキサート 11.55mg/body (30分) day8,15 デキサート 8.25mg/body (30分) day9,16 レナデックス 20mg/body (内服) day22
多発性骨髄腫	44 DPd皮下注 cycle1-2	ダラキューロ 1800mg (皮下注) day1,8,15,22 レナデックス 20mg/body (内服) day1,2,8,9,15,16,22,23 ポマリスト 4mg/body (内服) day1-21	28日	75歳以上患者の場合は、レナデックス20mg/週へ減量
多発性骨髄腫	45 DPd皮下注 cycle3-6	ダラキューロ 1800mg (皮下注) day1,15 レナデックス 20mg/body (内服) day1,2,15,16 レナデックス 40mg/body (内服) day8,22 ポマリスト 4mg/body (内服) day1-21	28日	75歳以上患者の場合は、レナデックス20mg/週へ減量
多発性骨髄腫	46 DPd皮下注 cycle7以降	ダラキューロ 1800mg (皮下注) day1 レナデックス 20mg/body (内服) day1,2 レナデックス 40mg/body (内服) day8,15,22 ポマリスト 4mg/body (内服) day1-21	28日	75歳以上患者の場合は、レナデックス20mg/週へ減量
多発性骨髄腫	47 IsaPd cycle1	サークリサ 10mg/kg (注意事項参照) day1,8,15,22 ポマリスト 4mg (内服) day1-21 デキサート 39.6mg/body day1,8,15,22	28日	サークリサの投与速度は適正使用ガイド参照 75歳以上患者の場合は、デキサート19.8mg/週へ減量

【診療科:血液・腫瘍内科】

がん種	レジメン名	レジメン内容	インターバル	注意事項
多発性骨髄腫	48 IsaPd cycle2以降	サークリサ 10mg/kg (注意事項参照) day1,15 ボマリスト 4mg(内服) day1-21 デキサート 39.6mg/body day1,15 レナデックス 40mg/body day8,22	28日	サークリサの投与速度は適正使用ガイド参照 75歳以上患者の場合は、デキサート19.8mg、レナデックス20mgへ減量
多発性骨髄腫	49 IsaKd cycle1	サークリサ 10mg/kg (注意事項参照) day1,8,15,22 カイプロリス 20mg/m2 (30分) day,1,2 カイプロリス 56mg/m2 (30分) day8,9,15,16 デキサート 19.8mg/body (30分) day1,2,8,9,15,16,22 レナデックス 20mg/body(内服) day23	28日	サークリサの投与速度は適正使用ガイド参照
多発性骨髄腫	50 IsaKd cycle2以降	サークリサ 10mg/kg (注意事項参照) day1,15 カイプロリス 56mg/m2 (30分) day1,2,8,9,15,16 デキサート 19.8mg/body (30分) day1,2,8,9,15,16 レナデックス 20mg/body(内服) day22,23	28日	サークリサの投与速度は適正使用ガイド参照
多発性骨髄腫	51 Isa+d cycle1	サークリサ 20mg/kg (注意事項参照) day1,8,15,22 デキサート 39.6mg/body (30分) day1,8,15,22	28日	サークリサの投与速度は適正使用ガイド参照 75歳以上患者の場合は、デキサート19.8mg/週へ減量
多発性骨髄腫	52 Isa+d cycle2以降	サークリサ 20mg/kg (注意事項参照) day1,15 デキサート 39.6mg/body (30分) day1,15 レナデックス 40mg/body(内服) day8,22	28日	サークリサの投与速度は適正使用ガイド参照 75歳以上患者の場合は、レナデックス20mg/週へ減量
多発性骨髄腫	53 Isa単剤 cycle1	サークリサ 20mg/kg (注意事項参照) day1,8,15,22	28日	サークリサの投与速度は適正使用ガイド参照

【診療科:血液・腫瘍内科】

がん種		レジメン名	レジメン内容	インターバル	注意事項
多発性骨髄腫	54	Isa単剤 cycle2以降	サークリサ 20mg/kg (注意事項参照) day1,15	28日	サークリサの投与速度は適正使用ガイド参照
全身性アミロイドーシス	1	DCyBorD cycle1-2	ダラキューロ 1800mg (皮下注) day1,8,15,22 エンドキサン 300mg/m2 (点滴) day1,8,15,22 ペルケイド 1.3mg/m2 (皮下注) day1,8,15,22 デカドロン 20mg/body (内服) day1,2,8,9,15,16,22,23	28日	
全身性アミロイドーシス	2	DCyBorD cycle3-6	ダラキューロ 1800mg (皮下注) day1,15 エンドキサン 300mg/m2 (2時間) day1,8,15,22 ペルケイド 1.3mg/m2 (皮下注) day1,8,15,22 デカドロン 20mg/body (内服) day1,2,15,16 デカドロン 40mg/body (内服) day8,22	28日	
全身性アミロイドーシス	3	DCyBorD cycle7以降	ダラキューロ 1800mg (皮下注) day1 デカドロン 20mg/body (内服) day1	28日	
急性骨髄性白血病	1	アザシチジン	ビダーザ 75mg/m2 (10分点滴または皮下注) day1,2,3,4,5,6,7	28日	
急性骨髄性白血病	2	アザシチジン+ベネトクラクス	ビダーザ 75mg/m2 (10分または皮下注) day1,2,3,4,5,6,7 ベネクレクスタ(内服:添付文書参照)	28日	

【診療科:血液・腫瘍内科】

がん種		レジメン名	レジメン内容	インターバル	注意事項
慢性リンパ性白血病	1	リツキシマブ(初回)+ベネトクラクス	リツキサン 375mg/m ² (注意事項参照) day1 ベネクレクスタ(内服:添付文書参照)	28日	[1コース目] 50mL/hで開始、30分毎に50mL/hずつ速度を上げ、最大400mL/hまで [2コース目以降] 100mL/hで開始、30分毎に100mL/hずつ速度を上げ、最大400mL/hまで
慢性リンパ性白血病	2	リツキシマブ(2回目以降)+ベネトクラクス	リツキサン 500mg/m ² (注意事項参照) day1 ベネクレクスタ(内服:添付文書参照)	28日	初回含め最大6コース [1コース目] 50mL/hで開始、30分毎に50mL/hずつ速度を上げ、最大400mL/hまで [2コース目以降] 100mL/hで開始、30分毎に100mL/hずつ速度を上げ、最大400mL/hまで
悪性黒色腫	1	Nivolumab	オブジーボ 240mg/body (30分) day1	14日	
悪性黒色腫	2	Nivolumab(4週)	オブジーボ 480mg/body (30分) day1	28日	
悪性黒色腫	3	Pembrolizimab	キイトルーダ 200mg/body (30分) day1	21日	
悪性黒色腫	4	Pembrolizimab(6週)	キイトルーダ 400mg/body (30分) day1	42日	

【診療科:血液・腫瘍内科】

がん種	レジメン名	レジメン内容	インターバル	注意事項
悪性黒色腫	5 Nivolumab+Ipilimumab	オプジーボ 80mg/body (30分) day1 ヤーボイ 3mg/kg (30分) day1	21日	ヤーボイは最大4回まで
悪性黒色腫	6 Ipilimumab	ヤーボイ 3mg/kg (30分) day1	21日	ヤーボイは最大4回まで