

【診療科:泌尿器科】

がん種	レジメン名	レジメン内容	インターバル	注意事項
腎細胞癌	1 <b>Nivolumab</b>	オプジーボ 240mg/body (30分) day1	14日	
腎細胞癌	2 <b>Nivolumab(4週)</b>	オプジーボ 480mg/body (30分) day1	28日	
腎細胞癌	3 <b>Nivolumab+Ipilimumab</b>	オプジーボ 240mg/body (30分) day1 ヤーボイ 1mg/kg (30分) day1	21日	IMDCリスク分類がintermediate又はpoorリスクの患者対象 ヤーボイは最大4回まで
腎細胞癌	4 <b>Nivolumab+Cabozantinib</b>	オプジーボ 240mg/body (30分) day1 カボメティクス 40mg×1(内服)連日	14日	
腎細胞癌	5 <b>Nivolumab+Cabozantinib(4週)</b>	オプジーボ 480mg/body (30分) day1 カボメティクス 40mg×1(内服)連日	28日	
腎細胞癌	6 <b>Pembrolizumab+Axitinib</b>	キイトルーダ 200mg/body (30分) day1 インライタ 5mg×2(内服)連日	21日	
腎細胞癌	7 <b>Pembrolizumab+Axitinib(6週)</b>	キイトルーダ 400mg/body (30分) day1 インライタ 5mg×2(内服)連日	42日	
腎細胞癌	8 <b>Pembrolizumab+Lenvatinib</b>	キイトルーダ 200mg/body (30分) day1 レンビマ 20mg×1(内服)連日	21日	
腎細胞癌	9 <b>Pembrolizumab+Lenvatinib(6週)</b>	キイトルーダ 400mg/body (30分) day1 レンビマ 20mg×1(内服)連日	42日	
腎細胞癌	10 <b>Avelumab+Axitinib</b>	バベンチオ 10mg/kg (1時間) day1 インライタ 5mg×2(内服)連日	14日	
腎細胞癌	11 <b>テムシロリムス</b>	トーリセル 25mg/body (1時間) day1,8,15,22	28日	

【診療科:泌尿器科】

がん種	レジメン名	レジメン内容	インターバル	注意事項
腎細胞癌	12 <b>Pembrolizumab</b>	キイトルーダ 200mg/body (30分) day1	21日	
腎細胞癌	13 <b>Pembrolizumab (6週)</b>	キイトルーダ 400mg/body (30分) day1	42日	
腎・後腹膜肉腫	1 <b>DXR+IFM</b>	イホマイド 2000mg/m <sup>2</sup> (4時間) day1,2,3,4,5 ドキシソルピシン 30mg/m <sup>2</sup> (30分) day1,2	21日	
腎・後腹膜肉腫	2 <b>DXR</b>	ドキシソルピシン 30mg/m <sup>2</sup> (30分) day1,2	21日	
腎・後腹膜肉腫	3 <b>GEM+DOC</b>	ゲムシタビン 900mg/m <sup>2</sup> (30分) day1,8 ドセタキセル 70mg/m <sup>2</sup> (1時間) day8	21日	
前立腺癌	1 <b>DOC+PSL</b>	ドセタキセル 60-75mg/m <sup>2</sup> (3時間) day1 プレドニン 10mg/body (内服) 連日	21日	
前立腺癌	2 <b>カバジタキセル+PSL</b>	カバジタキセル 25mg/m <sup>2</sup> (1時間) day1 プレドニン 10mg/body (内服) 連日	21日	
前立腺癌	3 <b>DOC+ダロルタミド</b>	ドセタキセル 60-75mg/m <sup>2</sup> (3時間) day1 ニューベクオ 600mg/body × 2 (内服) 連日	21日	ADT (LHRHアゴニスト/アンタゴニストまたは精巣摘除術) 併用 プレドニンを併用する場合がある ドセタキセルは最大6サイクル
膀胱癌	1 <b>EV+Pembrolizumab</b>	パドセブ 1.25mg/kg (30分) day1,8 キイトルーダ 200mg/body (30分) day1	21日	
膀胱癌	2 <b>GEM+CDDP</b>	ゲムシタビン 1000mg/m <sup>2</sup> (30分) day1,8,15 シスプラチン 70mg/m <sup>2</sup> (3時間) day2	28日	
膀胱癌	3 <b>GEM+CDDP(3-week)</b>	ゲムシタビン 1000mg/m <sup>2</sup> (30分) day1,8 シスプラチン 70mg/m <sup>2</sup> (3時間) day2	21日	

【診療科:泌尿器科】

がん種	レジメン名	レジメン内容	インターバル	注意事項
膀胱癌	4 GEM+CBDCA	ゲムシタビン 800mg/m <sup>2</sup> (30分) day1,8 カルボプラチン AUC5 (2時間) day1	21日	
膀胱癌	5 Pembrolizumab	キイトルーダ 200mg/body (30分) day1	21日	
膀胱癌	6 Pembrolizumab(6週)	キイトルーダ 400mg/body (30分) day1	42日	
膀胱癌	7 エンホルツマブ ベドチン	パドセブ 1.25mg/kg (30分) day1,8,15	28日	
膀胱癌	8 M-VAC	メソトレキセート 30mg/m <sup>2</sup> (1時間) day1,15,22 エグザール 3mg/m <sup>2</sup> (1時間) day2,15,22 ドキシソビシン 30mg/m <sup>2</sup> (1時間) day2 シスプラチン 70mg/m <sup>2</sup> (3時間) day2	28日	
膀胱癌	9 PAC+CBDCA	パクリタキセル 180mg/m <sup>2</sup> (3時間) day1 カルボプラチン AUC5 (2時間) day1	21日	
膀胱癌	10 Nivolumab	オブジーボ 240mg/body (30分) day1	14日	術後補助療法
膀胱癌	11 Nivolumab(4週)	オブジーボ 480mg/body (30分) day1	28日	術後補助療法
胚細胞腫瘍	1 BEP	エトポシド 100mg/m <sup>2</sup> (2.5時間) day1,2,3,4,5 プレオマイシン 30mg/body (筋注) day1,8,15 シスプラチン 20mg/m <sup>2</sup> (3時間) day1,2,3,4,5	21日	IGCC分類 good risk は3コース intermediate or poor riskは4コース投与する
陰茎癌	1 5-FU+CDDP	フルオロウラシル 960mg/m <sup>2</sup> (24時間) day2,3,4,5,6 シスプラチン 100mg/m <sup>2</sup> (2.5時間) day1	21日	
尿道癌	1 GEM+CDDP	ゲムシタビン 1000mg/m <sup>2</sup> day1,8 シスプラチン 70mg/m <sup>2</sup> day2	21日	

## 【診療科:泌尿器科】

がん種	レジメン名	レジメン内容	インターバル	注意事項
臓器横断	1 <b>Pembrolizumab(3週)</b>	キイトルーダ 200mg/body (30分) day1	21日	MSI HighまたはTMB Highの場合に使用
臓器横断	2 <b>Pembrolizumab(6週)</b>	キイトルーダ 400mg/body (30分) day1	42日	MSI HighまたはTMB Highの場合に使用