

【診療科:産科婦人科】

がん種		レジメン名	レジメン内容	インターバル	注意事項
卵巣癌	1	TC	パクリタキセル 175mg/m ² (3時間) day1 カルボプラチン AUC6 (1時間) day1	21日	
卵巣癌	2	TC+BEV	パクリタキセル 175mg/m ² (3時間) day1 カルボプラチン AUC6 (1時間) day1 アバステチン 15mg/kg (30分) day1	21日	アバステチン 初回90分、2回目60分、3回目以降30分
卵巣癌	3	DC	ドセタキセル 60mg/m ² (3時間) day1 カルボプラチン AUC6 (1時間) day1	21日	
卵巣癌	4	DC+BEV	ドセタキセル 60mg/m ² (3時間) day1 カルボプラチン AUC6 (1時間) day1 アバステチン 15mg/kg (30分) day1	21日	アバステチン 初回90分、2回目60分、3回目以降30分
卵巣癌	5	dd-TC	パクリタキセル 80mg/m ² (1時間) day1,8,15 カルボプラチン AUC6 (1時間) day1	21日	
卵巣癌	6	DC (weekly)	ドセタキセル 35mg/m ² (1時間) day1,8,15 カルボプラチン AUC2 (1時間) day1,8,15	28日	
卵巣癌	7	TC (weekly)	パクリタキセル 80mg/m ² (1時間) day1,8,15 カルボプラチン AUC2 (1時間) day1,8,15	28日	
卵巣癌	8	PLD	ドキシル 40mg/m ² (90分) day1	28日	
卵巣癌	9	PLD+BEV	ドキシル 40mg/m ² (90分) day1 アバステチン 10mg/kg (30分) day1,15	28日	アバステチン 初回90分、2回目60分、3回目以降30分
卵巣癌	10	PLD+CBDCA	ドキシル 30mg/m ² (90分) day1 カルボプラチン AUC5 (1時間) day1	28日	
卵巣癌	11	PLD+CBDCA+BEV	ドキシル 30mg/m ² (90分) day1 カルボプラチン AUC5 (1時間) day1 アバステチン 10mg/kg (30分) day1,15	28日	アバステチン 初回90分、2回目60分、3回目以降30分

【診療科:産科婦人科】

がん種		レジメン名	レジメン内容	インターバル	注意事項
卵巣癌	12	GEM+CBDCA	ゲムシタピン 800mg/m ² (30分) day1,8 カルボプラチン AUC4 (1時間) day1	21日	
卵巣癌	13	GPT-11 (Weekly)	イリノテカン 100mg/m ² (90分) day1,8,15	28日	
卵巣癌	14	GEM (day1,8,15)	ゲムシタピン 1000mg/m ² (30分) day1,8,15	28日	
卵巣癌	15	GEM (day1,8)	ゲムシタピン 1000mg/m ² (30分) day1,8	21日	
卵巣癌	16	ノギテカン	ハイカムチン 1.25mg/m ² (30分) day1,2,3,4,5	21日	
卵巣癌	17	ノギテカン+BEV	アバステン 15mg/kg (30分) day1 ハイカムチン 1.25mg/m ² (30分) day1,2,3,4,5	21日	アバステン 初回90分、2回目60分、3回目以降30分
卵巣癌	18	BEV維持	アバステン 15mg/kg (30分) day1	21日	
卵巣癌	19	オラパリブ+BEV	アバステン 15mg/kg (30分) day1 リムバーザ 300mg × 2/日 (内服) 連日	21日	アバステン 初回90分、2回目60分、3回目以降30分
子宮体癌	1	TC	パクリタキセル 175mg/m ² (3時間) day1 カルボプラチン AUC6 (1時間) day1	21日	
子宮体癌	2	DC	ドセタキセル 60mg/m ² (3時間) day1 カルボプラチン AUC6 (1時間) day1	21日	
子宮体癌	3	dd-TC	パクリタキセル 80mg/m ² (1時間) day1,8,15 カルボプラチン AUC6 (1時間) day1	21日	

【診療科:産科婦人科】

がん種		レジメン名	レジメン内容	インターバル	注意事項
子宮体癌	4	AP	ドキシソルビシン 60mg/m ² (10分) day1 シスプラチン 50mg/m ² (2時間) day1	21日	
子宮体癌	5	DXR(60mg/m ²)	ドキシソルビシン 60mg/m ² (10分) day1	21日	
子宮体癌	6	Pembrolizumab+Lenvatinib(3週)	キイトルーダ200mg/body (30分) day1 レンビマ 20mg (内服) 連日	21日	
子宮体癌	7	Pembrolizumab+Lenvatinib(6週)	キイトルーダ400mg/body (30分) day1 レンビマ 20mg (内服) 連日	42日	
子宮頸癌	1	Weekly CDDP+RT	シスプラチン 40mg/m ² (90分) day1,8,15,22,29,36	42日	
子宮頸癌	2	Pembrolizumab+CCRT	キイトルーダ200mg/body (30分) day1,22 シスプラチン 40mg/m ² (90分) day1,8,15,22,29,36	42日	Pembrolizumab (CCRT併用day1,22、以降維持療法200mg/3週毎または400mg/6週毎) Pembrolizumabは維持療法を含めて投与期間は24ヵ月間
子宮頸癌	3	TP(3hr)	パクリタキセル 175mg/m ² (3時間) day1 シスプラチン 50mg/m ² (2時間) day2	21日	
子宮頸癌	4	TP(3hr)+BEV	パクリタキセル 175mg/m ² (3時間) day1 シスプラチン 50mg/m ² (2時間) day2 アバステン 15mg/kg (30分) day1	21日	アバステン 初回90分、2回目60分、3回目以降30分
子宮頸癌	5	TC	パクリタキセル 175mg/m ² (3時間) day1 カルボプラチン AUC5 (1時間) day1	21日	
子宮頸癌	6	DC	ドセタキセル 60mg/m ² (3時間) day1 カルボプラチン AUC5 (1時間) day1	21日	
子宮頸癌	7	TC+BEV	パクリタキセル 175mg/m ² (3時間) day1 カルボプラチン AUC5 (1時間) day1 アバステン 15mg/kg (30分) day1	21日	アバステン 初回90分、2回目60分、3回目以降30分

【診療科:産科婦人科】

がん種		レジメン名	レジメン内容	インターバル	注意事項
子宮頸癌	8	DC+BEV	ドセタキセル 60mg/m ² (3時間) day1 カルボプラチン AUC5 (1時間) day1 アバスチン 15mg/kg (30分) day1	21日	アバスチン 初回90分、2回目60分、3回目以降30分
子宮頸癌	9	Pembrolizumab+TP	キイトルーダ 200mg/body (30分) day1 パクリタキセル 175mg/m ² (3時間) day1 シスプラチン 50mg/m ² (2時間) day1	21日	
子宮頸癌	10	Pembrolizumab+TC	キイトルーダ 200mg/body (30分) day1 パクリタキセル 175mg/m ² (3時間) day1 カルボプラチン AUC5 (1時間) day1	21日	
子宮頸癌	11	Pembrolizumab+TP+BEV	キイトルーダ 200mg/body (30分) day1 パクリタキセル 175mg/m ² (3時間) day1 シスプラチン 50mg/m ² (2時間) day1 アバスチン 15mg/kg (30分) day1	21日	アバスチン 初回90分、2回目60分、3回目以降30分
子宮頸癌	12	Pembrolizumab+TC+BEV	キイトルーダ 200mg/body (30分) day1 パクリタキセル 175mg/m ² (3時間) day1 カルボプラチン AUC5 (1時間) day1 アバスチン 15mg/kg (30分) day1	21日	アバスチン 初回90分、2回目60分、3回目以降30分
子宮頸癌	13	Cemiplimab	リブタヨ 350mg/body (30分) day1	21日	
子宮頸癌	14	Nedaplatin+CPT-11	イリノテカン 50mg/m ² (90分) day1,8,15 アクブラ 80mg/m ² (2時間) day1	28日	
胚細胞腫	1	BEP	エトポシド 100mg/m ² (2時間) day1,2,3,4,5 シスプラチン 20mg/m ² (2時間) day1,2,3,4,5 ブレオ 20mg/m ² (30分) day2,9,16	21日	
悪性軟部肉腫	1	エリブリン	ハラヴェン 1.4mg/m ² (5分) day1,8	21日	
悪性軟部肉腫	2	トラベクテジン単剤	ヨンデリス 1.2mg/m ² (24時間) day1	21日	
悪性軟部肉腫	3	GEM+DOC	ゲムシタピン 800mg/m ² (30分) day1,8 ドセタキセル 60mg/m ² (1時間) day8	21日	

【診療科:産科婦人科】

がん種		レジメン名	レジメン内容	インターバル	注意事項
悪性軟部肉腫	4	DXR(75mg/m²)	ドキシソルビシン 75mg/m ² (10分) day1	21日	
臓器横断	1	Pembrolizumab(3週)	キイトルーダ200mg/body (30分) day1	21日	MSI HighまたはTMB Highの場合に使用
臓器横断	2	Pembrolizumab(6週)	キイトルーダ400mg/body (30分) day1	42日	MSI HighまたはTMB Highの場合に使用