

【診療科:消化器内科】

がん種		レジメン名	レジメン内容	インターバル	注意事項
肝細胞癌	1	ラムシルマブ	サイラムザ 8mg/kg (30分) day1	14日	初回60分、2回目以降30分
肝細胞癌	2	Atezolizumab+BEV	テセントリク 1200mg/body (30分) day1 アバステン 15mg/kg (30分) day1	21日	テセントリク 初回60分、2回目以降30分 アバステン 初回90分、2回目60分、3回目以降30分
肝細胞癌	3	Durvalumab+Tremelimumab	イミフィンジ 1500mg/body (1時間) day1 イジユド 300mg/body (1時間) day1	28日	30kg以下の場合 イジユド4mg/kg、イミフィンジ20mg/kg
肝細胞癌	4	Durvalumab	イミフィンジ 1500mg/body (1時間) day1	28日	30kg以下の場合 20mg/kg
食道癌	1	FP	フルオロウラシル 700mg/m2 (24時間) day1,2,3,4,5 シスプラチン 70mg/m2 (2時間) day1	21日	
食道癌	2	ネダプラチン+5-FU	フルオロウラシル 800mg/m2 (24時間) day1,2,3,4,5 アクブラ 90mg/m2 (2時間) day1	28日	
食道癌	3	Nivolumab	オブジーボ 240mg/body (30分) day1	14日	
食道癌	4	Nivolumab(4週)	オブジーボ 480mg/body (30分) day1	28日	
食道癌	5	Pembrolizumab	キイトルーダ 200mg/body (30分) day1	21日	
食道癌	6	Pembrolizumab(6週)	キイトルーダ 400mg/body (30分) day1	42日	
食道癌	7	Pembrolizumab+FP	キイトルーダ 200mg/body (30分) day1 フルオロウラシル 800mg/m2 (24時間) day1,2,3,4,5 シスプラチン 80mg/m2 (2時間) day1	21日	

【診療科:消化器内科】

がん種		レジメン名	レジメン内容	インターバル	注意事項
食道癌	8	Pembrolizumab+5-FU	キイトルーダ 200mg/body (30分) day1 フルオロウラシル 800mg/m2 (24時間) day1,2,3,4,5	21日	
食道癌	9	Pembrolizumab+5-FU(6週)	キイトルーダ 400mg/body (30分) day1 フルオロウラシル 800mg/m2 (24時間) day1,2,3,4,5	42日	
食道癌	10	Tislelizumab+FP	テビムブラ 200mg/body(30分) day1 フルオロウラシル 800mg/m2 (24時間) day1-5 シスプラチン 70mg/m2 (2時間) day1	21日	テビムブラ 初回60分、2回目以降30分
食道癌	11	Tislelizumab	テビムブラ 200mg/body(30分) day1	21日	テビムブラ 初回60分、2回目以降30分
食道癌	12	PAC	パクリタキセル 100mg/m2 (60分) day1,8,15,22,29,36	49日	
胃癌	1	SP	シスプラチン 60mg/m2 (2時間) day8 エスワンタイホウ 40mg/m2 × 2 day1-14	35日	
胃癌	2	SPT(初回)	ハーセプチン 8mg/kg (90分) day1 シスプラチン 60mg/m2 (2時間) day1 エスワンタイホウ 40mg/m2 × 2(内服) day1-14	21日	
胃癌	3	SPT(2回目以降)	ハーセプチン 6mg/kg (30分) day1 シスプラチン 60mg/m2 (2時間) day1 エスワンタイホウ 40mg/m2 × 2(内服) day1-14	21日	
胃癌	4	XP+Tmab(初回)	ハーセプチン 8mg/kg (90分) day1 シスプラチン 80mg/m2 (2時間) day1 カペシタビン 1000mg/m2 × 2 day1-14	21日	
胃癌	5	XP+Tmab(2回目以降)	ハーセプチン 6mg/kg (30分) day1 シスプラチン 80mg/m2 (2時間) day1 カペシタビン 1000mg/m2 × 2 day1-14	21日	
胃癌	6	SOX	エスワンタイホウ 40mg/m2 × 2 day1-14 オキサリプラチン 100mg/m2 (2時間) day1	21日	

【診療科:消化器内科】

がん種		レジメン名	レジメン内容	インターバル	注意事項
胃癌	7	CapeOX	カペシタビン 1000mg/m ² ×2 day1-14 オキサリプラチン 130mg/m ² (2時間) day1	21日	
胃癌	8	Nivo+SOX	オブジーボ 360mg/body (30分) day1 エスワンタイホウ 40mg/m ² ×2 day1-14 オキサリプラチン 100mg/m ² (2時間) day1	21日	
胃癌	9	Nivo+CapeOX	オブジーボ 360mg/body (30分) day1 カペシタビン 1000mg/m ² ×2 day1-14 オキサリプラチン 130mg/m ² (2時間) day1	21日	
胃癌	10	Nivo+mFOLFOX6	オブジーボ 240mg/body (30分) day1 レボホリナート 200mg/m ² (2時間) day1 オキサリプラチン 85mg/m ² (2時間) day1 フルオロウラシル 400mg/m ² (10分) day1 フルオロウラシル 2400mg/m ² (46時間) day1	14日	
胃癌	11	Pembrolizumab+CapeOX	キイトルーダ 200mg/body (30分) day1 カペシタビン 1000mg/m ² ×2 day1-14 オキサリプラチン 130mg/m ² (2時間) day1	21日	
胃癌	12	Pembrolizumab+Tmab+CapeOX(初回)	キイトルーダ 200mg/body (30分) day1 カペシタビン 1000mg/m ² ×2 day1-14 オキサリプラチン 130mg/m ² (2時間) day1 ハーセプチンまたはトラスツズマブBS 8mg/kg (90分) day1	21日	
胃癌	13	Pembrolizumab+Tmab+CapeOX(2回目以降)	キイトルーダ 200mg/body (30分) day1 カペシタビン 1000mg/m ² ×2 day1-14 オキサリプラチン 130mg/m ² (2時間) day1 ハーセプチンまたはトラスツズマブBS 6mg/kg (30分) day1	21日	
胃癌	14	Zolbetuximab+CapeOX(初回)	ピロイ 800mg/m ² (注意事項参照) day1 カペシタビン 1000mg/m ² ×2 day1-14 オキサリプラチン 130mg/m ² (2時間) day1	21日	最初の1時間は50mL/h、次の1時間は100mL/h、以降は200mL/hと段階的に速度を調整する。
胃癌	15	Zolbetuximab+CapeOX(cycle2以降)	ピロイ 600mg/m ² (注意事項参照) day1 カペシタビン 1000mg/m ² ×2 day1-14 オキサリプラチン 130mg/m ² (2時間) day1	21日	最初の30分は40mL/h、次の30分は90mL/h、以降は180mL/hと段階的に速度を調整する。
胃癌	16	Zolbetuximab+mFOLFOX6(初回)	ピロイ 800mg/m ² (注意事項参照) day1 レボホリナート 200mg/m ² (2時間) day1 オキサリプラチン 85mg/m ² (2時間) day1 フルオロウラシル 400mg/m ² (10分) day1 フルオロウラシル 2400mg/m ² (46時間) day1	14日	最初の1時間は50mL/h、次の1時間は100mL/h、以降は200mL/hと段階的に速度を調整する。
胃癌	17	Zolbetuximab+mFOLFOX6(cycle2以降)	ピロイ 400mg/m ² (注意事項参照) day1 レボホリナート 200mg/m ² (2時間) day1 オキサリプラチン 85mg/m ² (2時間) day1 フルオロウラシル 400mg/m ² (10分) day1 フルオロウラシル 2400mg/m ² (46時間) day1	14日	最初の30分は30mL/h、次の30分は60mL/h、以降は120mL/hと段階的に速度を調整する。

【診療科:消化器内科】

がん種		レジメン名	レジメン内容	インターバル	注意事項
胃癌	18	RAM+PAC	サイラムザ 8mg/kg (30分) day1,15 パクリタキセル 80mg/m2 (1時間) day1,8,15	28日	サイラムザ 初回60分、2回目を以降30分
胃癌	19	Nivolumab	オブジーボ 240mg/body (30分) day1	14日	
胃癌	20	Nivolumab(4週)	オブジーボ 480mg/body (30分) day1	28日	
胃癌	21	CPT-11	イリノテカン 150mg/m2 (90分) day1	14日	
胃癌	22	RAM	サイラムザ 8mg/kg (30分) day1	14日	初回60分、2回目を以降30分
結腸直腸	1	XELOX	オキサリプラチン 130mg/m2 (2時間) day1 カペシタビン 1000mg/m2 × 2 day1-14	21日	
結腸直腸	2	XELOX+BEV	アバステン 7.5mg/kg (30分) day1 オキサリプラチン 130mg/m2 (2時間) day1 カペシタビン 1000mg/m2 × 2 day1-14	21日	アバステン 初回90分、2回目60分、3回目を以降30分
膵癌	1	GEM	ゲムシタビン 1000mg/m2 (30分) day1,8,15	21日	
膵癌	2	nab-PAC+GEM	nab/パクリタキセル 125mg/m2 (30分) day1,8,15 ゲムシタビン 1000mg/m2 (30分) day1,8,15	28日	
膵癌	3	FOLFIRINOX	オキサリプラチン 85mg/m2 (2時間) day1 レボホリナート 200mg/m2 (2時間) day1 イリノテカン 180mg/m2 (90分) day1 フルオロウラシル 400mg/m2 (15分) day1 フルオロウラシル 2400mg/m2 (46時間) day1	14日	
膵癌	4	mFOLFIRINOX	オキサリプラチン 85mg/m2 (2時間) day1 レボホリナート 200mg/m2 (2時間) day1 イリノテカン 150mg/m2 (90分) day1 フルオロウラシル 2400mg/m2 (46時間) day1	14日	

【診療科:消化器内科】

がん種		レジメン名	レジメン内容	インターバル	注意事項
膵癌	5	nal-IRI+5-FU/LV	レボホリナート 200mg/m2 (2時間) day1 オニパイド 70mg/m2 (90分) day1 フルオロウラシル 2400mg/m2 (46時間) day1	14日	
胆道癌	1	CDDP+GEM	ゲムシタピン 1000mg/m2 (30分) day1,8 シスプラチン 25mg/m2 (2時間) day1,8	21日	
胆道癌	2	GEM+S-1	ゲムシタピン 1000mg/m2 (30分) day1,8 エスワンタイホウ 30mg/m2 × 2 (内服) day1-14	21日	ゲムシタピン 1000mg/m2 (30分) day1,15 エスワンタイホウ 40mg/m2 × 2 (内服) day1-14、インターバル28日とする場合あり
胆道癌	3	GCS	ゲムシタピン 1000mg/m2 (30分) day1 シスプラチン 25mg/m2 (2時間) day1 エスワンタイホウ 40mg/m2 × 2 (内服) day1-7	14日	
胆道癌	4	Durvalumab+CDDP+GEM	イミフィンジ 1500mg/body (1時間) day1 ゲムシタピン 1000mg/m2 (30分) day1,8 シスプラチン 25mg/m2 (2時間) day1,8	21日	イミフィンジ 30kg以下の場合 20mg/kg
胆道癌	5	Durvalumab維持	イミフィンジ 1500mg/body (1時間) day1	28日	30kg以下の場合 20mg/kg
胆道癌	6	Pembrolizumab+CDDP+GEM	キイトルーダ 200mg/body (30分) day1 ゲムシタピン 1000mg/m2 (30分) day1,8 シスプラチン 25mg/m2 (2時間) day1,8	21日	最大8サイクル
胆道癌	7	Pembrolizumab+GEM維持	キイトルーダ 200mg/body (30分) day1 ゲムシタピン 1000mg/m2 (30分) day1,8	21日	
胆道癌	8	S-1+CDDP	シスプラチン 20mg/body (90分) day1,8 エスワンタイホウ 40mg/m2 × 2 day1-14	28日	
神経内分泌癌	1	CPT-11+CDDP	イリノテカン 60mg/m2 (2時間) day1,8,15 シスプラチン 60mg/m2 (1時間) day1	28日	
神経内分泌癌	2	VP-16+CDDP	エトポシド 100mg/m2 (2時間) day1,2,3 シスプラチン 80mg/m2 (3時間) day1	21日	

【診療科:消化器内科】

がん種		レジメン名	レジメン内容	インターバル	注意事項
神経内分泌腫瘍	1	STZ+5-FU	ザノサー 500mg/m ² (30分) day1,2,3,4,5 フルオロウラシル 400mg/m ² (30分) day1,2,3,4,5	42日	
臓器横断	1	Pembrolizumab	キイトルーダ 200mg/body (30分) day1	21日	MSI HighまたはTMB Highの場合に使用
臓器横断	2	Pembrolizumab (6週)	キイトルーダ 400mg/body (30分) day1	42日	MSI HighまたはTMB Highの場合に使用
原発不明癌	1	PAC+GBDCA	パクリタキセル 200mg/m ² (3時間) day1 カルボプラチン AUC6 (1時間) day1	21日	
原発不明癌	2	Nivolumab	オブジーボ 240mg/body (30分) day1	14日	
原発不明癌	3	Nivolumab (4週)	オブジーボ 480mg/body (30分) day1	28日	