【診療科：血液・腫瘍内科】

がん種		レジメン名	レジメン内容	インターバル	注意事項
非ホジキンリンパ腫	1	**リツキシマブ**	リツキシマブBS 375mg/m2（注意事項参照）day1	7日	最大8コース [1コース目] 50mL/hで開始、30分毎に50mL/hずつ速度を上げ、最大400mL/hまで [2コース目以降] 100mL/hで開始、30分毎に100mL/hずつ速度を上げ、最大400mL/hまで [2コース目以降] 臨床的に重篤な心疾患がなく、初回投与時に発現した副作用が軽微であり、かつ投与前の末梢血リンパ球数が5000/μL未満である場合、90分間で投与することができる。最初の30分で投与量の20%（100mL/hr）、その後60分で投与量の80%（200mL/hr）を投与
非ホジキンリンパ腫	2	**リツキシマブ維持**	リツキシマブBS 375mg/m2（注意事項参照）day1	56日	最大12コース [1コース目] 50mL/hで開始、30分毎に50mL/hずつ速度を上げ、最大400mL/hまで [2コース目以降] 100mL/hで開始、30分毎に100mL/hずつ速度を上げ、最大400mL/hまで [2コース目以降] 臨床的に重篤な心疾患がなく、初回投与時に発現した副作用が軽微であり、かつ投与前の末梢血リンパ球数が5000/μL未満である場合、90分間で投与することができる。最初の30分で投与量の20%（100mL/hr）、その後60分で投与量の80%（200mL/hr）を投与
非ホジキンリンパ腫	3	**CHOP**	オンコビン1.4mg/m2（10分）day1 ドキソルビシン 50mg/m2（30分）day1 エンドキサン 750mg/m2（2時間）day1 プレドニン 100mg/body（内服）day1-5	21日	
非ホジキンリンパ腫	4	**R-CHOP**	リツキシマブBS 375mg/m2（注意事項参照）day1 オンコビン 1.4mg/m2（10分）day1 ドキソルビシン 50mg/m2（30分）day1 エンドキサン 750mg/m2（2時間）day1 プレドニン 100mg/body（内服）day1-5	21日	リツキシマブBS [1コース目] 50mL/hで開始、30分毎に50mL/hずつ速度を上げ、最大400mL/hまで [2コース目以降] 100mL/hで開始、30分毎に100mL/hずつ速度を上げ、最大400mL/hまで [2コース目以降] 臨床的に重篤な心疾患がなく、初回投与時に発現した副作用が軽微であり、かつ投与前の末梢血リンパ球数が5000/μL未満である場合、90分間で投与することができる。最初の30分で投与量の20%（100mL/hr）、その後60分で投与量の80%（200mL/hr）を投与
非ホジキンリンパ腫	5	**CVP**	オンコビン1.4mg/m2（10分）day1 エンドキサン 750mg/m2（2時間）day1 プレドニン 100mg/body（内服）day1-5	21日	
非ホジキンリンパ腫	6	**R-CVP**	リツキシマブBS 375mg/m2（注意事項参照）day1 オンコビン 1.4mg/m2（10分）day1 エンドキサン 750mg/m2（2時間）day1 プレドニン 100mg/body（内服）day1-5	21日	リツキシマブBS [1コース目] 50mL/hで開始、30分毎に50mL/hずつ速度を上げ、最大400mL/hまで [2コース目以降] 100mL/hで開始、30分毎に100mL/hずつ速度を上げ、最大400mL/hまで [2コース目以降] 臨床的に重篤な心疾患がなく、初回投与時に発現した副作用が軽微であり、かつ投与前の末梢血リンパ球数が5000/μL未満である場合、90分間で投与することができる。最初の30分で投与量の20%（100mL/hr）、その後60分で投与量の80%（200mL/hr）を投与

【診療科：血液・腫瘍内科】

がん種		レジメン名	レジメン内容	インターバル	注意事項
非ホジキンリンパ腫	7	**THP-COP(標準量)**	オンコビン 1.4mg/m2 (10分) day1 テラルビシン 50mg/m2 (30分) day1 エンドキサン 750mg/m2 (2時間) day1 プレドニン 100mg/body (内服) day1-5	21日	
非ホジキンリンパ腫	8	**R-THP-COP(標準量)**	リツキシマブBS 375mg/m2 (注意事項参照) day1 オンコビン 1.4mg/m2 (10分) day1 テラルビシン 50mg/m2 (30分) day1 エンドキサン 750mg/m2 (2時間) day1 プレドニン 100mg/body (内服) day1-5	21日	リツキシマブBS [1コース目] 50mL/hで開始、30分毎に50mL/hずつ速度を上げ、最大400mL/hまで [2コース目以降] 100mL/hで開始、30分毎に100mL/hずつ速度を上げ、最大400mL/hまで [2コース目以降] 臨床的に重篤な心疾患がなく、初回投与時に発現した副作用が軽微であり、かつ投与前の末梢血リンパ球数が5000/μL未満である場合、90分間で投与することができる。最初の30分で投与量の20%(100mL/hr)、その後60分で投与量の80%(200mL/hr)を投与
非ホジキンリンパ腫	9	**THP-COP(減量)**	オンコビン 1mg/m2 (10分) day1 テラルビシン 40mg/m2 (30分) day1 エンドキサン 600mg/m2 (2時間) day1 プレドニン 80mg/body (内服) day1-5	21日	
非ホジキンリンパ腫	10	**R-THP-COP(減量)**	リツキシマブBS 375mg/m2 (注意事項参照) day1 オンコビン 1mg/m2 (10分) day1 テラルビシン 40mg/m2 (30分) day1 エンドキサン 600mg/m2 (2時間) day1 プレドニン 80mg/body (内服) day1-5	21日	リツキシマブBS [1コース目] 50mL/hで開始、30分毎に50mL/hずつ速度を上げ、最大400mL/hまで [2コース目以降] 100mL/hで開始、30分毎に100mL/hずつ速度を上げ、最大400mL/hまで [2コース目以降] 臨床的に重篤な心疾患がなく、初回投与時に発現した副作用が軽微であり、かつ投与前の末梢血リンパ球数が5000/μL未満である場合、90分間で投与することができる。最初の30分で投与量の20%(100mL/hr)、その後60分で投与量の80%(200mL/hr)を投与
非ホジキンリンパ腫	11	**Pola-R-CHP**	リツキシマブBS 375mg/m2 (注意事項参照) day1 ポライビー 1.8mg/kg (90分) day1 ドキソルビシン 50mg/m2 (30分) day1 エンドキサン 750mg/m2 (30分) day1 プレドニン 100mg/body (内服) day1-5	21日	最大6コース リツキシマブBS [1コース目] 50mL/hで開始、30分毎に50mL/hずつ速度を上げ、最大400mL/hまで [2コース目以降] 100mL/hで開始、30分毎に100mL/hずつ速度を上げ、最大400mL/hまで [2コース目以降] 臨床的に重篤な心疾患がなく、初回投与時に発現した副作用が軽微であり、かつ投与前の末梢血リンパ球数が5000/μL未満である場合、90分間で投与することができる。最初の30分で投与量の20%(100mL/hr)、その後60分で投与量の80%(200mL/hr)を投与 ポライビー 1回目90分、2回目以降30分

【診療科：血液・腫瘍内科】

がん種		レジメン名	レジメン内容	インターバル	注意事項
非ホジキンリンパ腫	12	**Tafasitamab+Lenalidomide cycle1**	ミンジュビ　12mg/kg（注意事項参照） day1,4,8,15,22 レブラミド25mg/日（内服） day1-21	28日	ミンジュビの投与速度について 【初回】 溶解液100mlの場合は70ml/hrに固定とする。溶解液250mlの場合は初回70ml/hrで30分投与後に125ml/hrに上げる。 【2回目以降】 溶解液100mlの場合は70ml/hr、溶解液250mlの場合は125ml/hrとする。 レブラミドは最大12コース
非ホジキンリンパ腫	13	**Tafasitamab+Lenalidomide cycle2,3**	ミンジュビ　12mg/kg（注意事項参照） day1,8,15,22 レブラミド25mg/日（内服） day1-21（最大12コース）	28日	ミンジュビの投与速度について 溶解液100mlの場合は70ml/hr、溶解液250mlの場合は125ml/hrとする。 レブラミドは最大12コース
非ホジキンリンパ腫	14	**Tafasitamab+Lenalidomide cycle4-12**	ミンジュビ　12mg/kg（注意事項参照） day1,15 レブラミド25mg/日（内服） day1-21（最大12コース）	28日	ミンジュビの投与速度について 溶解液100mlの場合は70ml/hr、溶解液250mlの場合は125ml/hrとする。 レブラミドは最大12コース
非ホジキンリンパ腫	15	**Tafasitamab+Lenalidomide cycle13以降**	ミンジュビ　12mg/kg（注意事項参照） day1,15	28日	ミンジュビの投与速度について 溶解液100mlの場合は70ml/hr、溶解液250mlの場合は125ml/hrとする。 レブラミドは最大12コース
非ホジキンリンパ腫	16	**R2**	リツキシマブBS 375mg/m2（注意事項参照） 1コース目 day1,8,15,22　2コース目以降 day1　（最大5コース） レブラミド20mg/日(連日) day1-21　（最大12コース）	28日	リツキシマブBS ［1コース目］ 50mL/hで開始、30分毎に50mL/hずつ速度を上げ、最大400mL/hまで ［ 2回目以降］ 100mL/hで開始、30分毎に100mL/hずつ速度を上げ、最大400mL/hまで ［2回目以降］ 臨床的に重篤な心疾患がなく、初回投与時に発現した副作用が軽微であり、かつ投与前の末梢血リンパ球数が5000/μL未満である場合、90分間で投与することができる。最初の30分で投与量の20%（100mL/hr）、その後60分で投与量の80%（200mL/hr）を投与

【診療科：血液・腫瘍内科】

がん種		レジメン名	レジメン内容	インターバル	注意事項
非ホジキンリンパ腫	17	**R-B（day1-2） （低悪性度B細胞性非ホジキンリンパ腫、 マントル細胞リンパ腫）**	リツキシマブBS 375mg/m2（注意事項参照）day1 ベンダムスチン 90mg/m2（10分）day1,2	28日	リツキシマブBS ［1コース目］ 50mL/hで開始、30分毎に50mL/hずつ速度を上げ、最大400mL/hまで ［ 2コース目以降］ 100mL/hで開始、30分毎に100mL/hずつ速度を上げ、最大400mL/hまで ［2コース目以降］ 臨床的に重篤な心疾患がなく、初回投与時に発現した副作用が軽微であり、かつ投与前の末梢血リンパ球数が5000/μL未満である場合、90分間で投与することができる。最初の30分で投与量の20%（100mL/hr）、その後60分で投与量の80%（200mL/hr）を投与
非ホジキンリンパ腫	18	**R-B（day1-3） （低悪性度B細胞性非ホジキンリンパ腫、 マントル細胞リンパ腫）**	リツキシマブBS 375mg/m2（注意事項参照）day1 ベンダムスチン 90mg/m2（10分）day2,3	28日	リツキシマブBS ［1コース目］ 1日1回 点滴静注 50mL/hで開始、30分毎に50mL/hずつ速度を上げ、最大400mL/hまで ［ 2コース目以降］ 1日1回 点滴静注 100mL/hで開始、30分毎に100mL/hずつ速度を上げ、最大400mL/hまで ［2コース目以降］ 臨床的に重篤な心疾患がなく、初回投与時に発現した副作用が軽微であり、かつ投与前の末梢血リンパ球数が5000/μL未満である場合、90分間で投与することができる。最初の30分で投与量の20%（100mL/hr）、その後60分で投与量の80%（200mL/hr）を投与
非ホジキンリンパ腫	19	**R-B（day1-2） （びまん性大細胞型B細胞リンパ腫）**	リツキシマブBS 375mg/m2（注意事項参照）day1 ベンダムスチン 120mg/m2（10分）day1,2	21日	最大6コース リツキシマブBS ［1コース目］ 50mL/hで開始、30分毎に50mL/hずつ速度を上げ、最大400mL/hまで ［ 2コース目以降］ 100mL/hで開始、30分毎に100mL/hずつ速度を上げ、最大400mL/hまで ［2コース目以降］ 臨床的に重篤な心疾患がなく、初回投与時に発現した副作用が軽微であり、かつ投与前の末梢血リンパ球数が5000/μL未満である場合、90分間で投与することができる。最初の30分で投与量の20%（100mL/hr）、その後60分で投与量の80%（200mL/hr）を投与
非ホジキンリンパ腫	20	**R-B（day1-3） （びまん性大細胞型B細胞リンパ腫）**	リツキシマブBS 375mg/m2（注意事項参照）day1 ベンダムスチン 120mg/m2（10分）day2,3	21日	最大6コース リツキシマブBS ［1コース目］ 50mL/hで開始、30分毎に50mL/hずつ速度を上げ、最大400mL/hまで ［ 2コース目以降］ 100mL/hで開始、30分毎に100mL/hずつ速度を上げ、最大400mL/hまで ［2コース目以降］ 臨床的に重篤な心疾患がなく、初回投与時に発現した副作用が軽微であり、かつ投与前の末梢血リンパ球数が5000/μL未満である場合、90分間で投与することができる。最初の30分で投与量の20%（100mL/hr）、その後60分で投与量の80%（200mL/hr）を投与
非ホジキンリンパ腫	21	**ベンダムスチン**	ベンダムスチン 120mg/m2（10分）day1,2	21日	

【診療科：血液・腫瘍内科】

がん種		レジメン名	レジメン内容	インターバル	注意事項
非ホジキンリンパ腫	22	**Pola-R-B cycle1**	リツキシマブBS 375mg/m2（注意事項参照）day1 ポライビー 1.8mg/kg（90分）day2 ベンダムスチン　90mg/m2（10分）day2,3	21日	リツキシマブBS ［1コース目］ 50mL/hで開始、30分毎に50mL/hずつ速度を上げ、最大400mL/hまで ［ 2コース目以降］ 100mL/hで開始、30分毎に100mL/hずつ速度を上げ、最大400mL/hまで ［2コース目以降］ 臨床的に重篤な心疾患がなく、初回投与時に発現した副作用が軽微であり、かつ投与前の末梢血リンパ球数が5000/μL未満である場合、90分間で投与することができる。最初の30分で投与量の20%（100mL/hr）、その後60分で投与量の80%（200mL/hr）を投与 ポライビー 1回目90分、2回目以降30分
非ホジキンリンパ腫	23	**Pola-R-B cycle2-6**	リツキシマブBS 375mg/m2（注意事項参照）day1 ポライビー 1.8mg/kg（90分）day1 ベンダムスチン　90mg/m2（10分）day1,2	21日	リツキシマブBS ［1コース目］ 50mL/hで開始、30分毎に50mL/hずつ速度を上げ、最大400mL/hまで ［ 2コース目以降］ 100mL/hで開始、30分毎に100mL/hずつ速度を上げ、最大400mL/hまで ［2コース目以降］ 臨床的に重篤な心疾患がなく、初回投与時に発現した副作用が軽微であり、かつ投与前の末梢血リンパ球数が5000/μL未満である場合、90分間で投与することができる。最初の30分で投与量の20%（100mL/hr）、その後60分で投与量の80%（200mL/hr）を投与 ポライビー 1回目90分、2回目以降30分
非ホジキンリンパ腫	24	**G-CHOP**	ガザイバ　1000mg/body（注意事項参照） 1コース目day1,8,15、2コース目以降day1 オンコビン 1.4mg/m2（10分）day1 ドキソルビシン 50mg/m2（30分）day1 エンドキサン 750mg/m2（2時間）day1 プレドニン 100mg/body　day1-5	21日	最大8コース ガザイバ ［初回］ 12.5mL/hで開始、30分毎に12.5mL/hずつ速度を上げ、最大100mL/hまで ［2回目以降］前回の投与でGrade2以上のinfusion reactionが発現しなかった場合 25mL/hで投与を開始、30分毎に25mL/hずつ、最大100mL/hまで ［2コース目以降］第1サイクルの投与でGrade 3以上のinfusion reactionが発現しなかった場合 最初の30分は25mL/hrで開始、その後最大225mL/hrまで上げることができる
非ホジキンリンパ腫	25	**G-B（day1-2）**	ガザイバ　1000mg/body（注意事項参照） 1コース目day1,8,15、2コース目以降day1 ベンダムスチン 90mg/m2（10分）day1,2	28日	最大6コース ガザイバ ［初回］ 12.5mL/hで開始、30分毎に12.5mL/hずつ速度を上げ、最大100mL/hまで ［2回目以降］前回の投与でGrade2以上のinfusion reactionが発現しなかった場合 25mL/hで投与を開始、30分毎に25mL/hずつ、最大100mL/hまで ［2コース目以降］第1サイクルの投与でGrade 3以上のinfusion reactionが発現しなかった場合 最初の30分は25mL/hrで開始、その後最大225mL/hrまで上げることができる
非ホジキンリンパ腫	26	**G-B（day1-3）**	ガザイバ　1000mg/body（注意事項参照） 1コース目day1,8,15、2コース目以降day1 ベンダムスチン 90mg/m2（10分）day2,3	28日	最大6コース ガザイバ ［初回］ 12.5mL/hで開始、30分毎に12.5mL/hずつ速度を上げ、最大100mL/hまで ［2回目以降］前回の投与でGrade2以上のinfusion reactionが発現しなかった場合 25mL/hで投与を開始、30分毎に25mL/hずつ、最大100mL/hまで ［2コース目以降］第1サイクルの投与でGrade 3以上のinfusion reactionが発現しなかった場合 最初の30分は25mL/hrで開始、その後最大225mL/hrまで上げることができる

【診療科：血液・腫瘍内科】

がん種		レジメン名	レジメン内容	インターバル	注意事項
非ホジキンリンパ腫	27	**ガザイバ維持**	ガザイバ　1000mg/body（注意事項参照）day1	56日	最大12コース [初回] 12.5mL/hで開始、30分毎に12.5mL/hずつ速度を上げ、最大100mL/hまで [2回目以降]前回の投与でGrade2以上のinfusion reactionが発現しなかった場合 25mL/hで投与を開始、30分毎に25mL/hずつ、最大100mL/hまで [2コース目以降]第1サイクルの投与でGrade 3以上のinfusion reactionが発現しなかった場合 最初の30分は25mL/hrで開始、その後最大225mL/hrまで上げることができる
非ホジキンリンパ腫	28	**CPT-11**	イリノテカン 40mg/m2（1時間）day1,2,3	7日	2週毎または3週毎の場合もある
非ホジキンリンパ腫	29	**LBCL エプコリタマブ cycle1**	エプキンリ 0.16mg/body（皮下注）day1 エプキンリ 0.8mg/body（皮下注）day8 エプキンリ 48mg/body（皮下注）day15,22	28日	
非ホジキンリンパ腫	30	**LBCL エプコリタマブ cycle2,3**	エプキンリ 48mg/body（皮下注）day1,8,15,22	28日	
非ホジキンリンパ腫	31	**LBCL エプコリタマブ cycle4-9**	エプキンリ 48mg/body（皮下注）day1,15	28日	
非ホジキンリンパ腫	32	**LBCL エプコリタマブ cycle10以降**	エプキンリ 48mg/body（皮下注）day1	28日	

【診療科：血液・腫瘍内科】

がん種		レジメン名	レジメン内容	インターバル	注意事項
非ホジキンリンパ腫	33	**Mosun-Pola cycle1**	ルンスミオ 5mg/body（皮下注） day1 ルンスミオ 45mg/body（皮下注） day8.15 ポライビー 1.8mg/kg（90分） day1	21日	
非ホジキンリンパ腫	34	**Mosun-Pola cycle2-6**	ルンスミオ 45mg/body（皮下注） day1 ポライビー 1.8mg/kg（30分） day1	21日	
非ホジキンリンパ腫	35	**Mosun-Pola cycle7-8**	ルンスミオ 45mg/body（皮下注） day1	21日	最大8サイクル
非ホジキンリンパ腫	36	**FL(G1-3A) エプコリタマブ cycle1**	エプキンリ 0.16mg/body（皮下注） day1 エプキンリ 0.8mg/body（皮下注） day8 エプキンリ 3mg/body（皮下注） day15 エプキンリ 48mg/body（皮下注） day22	28日	
非ホジキンリンパ腫	37	**FL(G1-3A) エプコリタマブ cycle2,3**	エプキンリ 48mg/body（皮下注） day1,8,15,22	28日	
非ホジキンリンパ腫	38	**FL(G1-3A) エプコリタマブ cycle4-9**	エプキンリ 48mg/body（皮下注） day1,15	28日	

【診療科：血液・腫瘍内科】

がん種		レジメン名	レジメン内容	インターバル	注意事項
非ホジキンリンパ腫	39	**FL(G1-3A) エプコリタマブ cycle10以降**	エプキンリ 48mg/body (皮下注) day1	28日	
非ホジキンリンパ腫	40	**FL モスネツズマブ cycle1**	ルンスミオ 1mg/body (4時間) day1 ルンスミオ 2mg/body (4時間) day8 エプキンリ 60mg/body (4時間) day15	21日	
非ホジキンリンパ腫	41	**FL モスネツズマブ cycle2**	ルンスミオ 60mg/body (2時間) day1	21日	1サイクル目の忍容性が良好だった場合、投与時間を2時間まで短縮することができる。
非ホジキンリンパ腫	42	**FL モスネツズマブ cycle3-17**	ルンスミオ 30mg/body (2時間) day1	21日	1サイクル目の忍容性が良好だった場合、投与時間を2時間まで短縮することができる。 8サイクル終了時に、完全奏効が得られた患者は投与を終了し、また、病勢安定又は部分奏効が得られた患者は、計17サイクルまで投与を継続する。
非ホジキンリンパ腫	43	**FL モスネツズマブ皮下注 cycle1**	ルンスミオ皮下注 5mg/body day1 ルンスミオ皮下注 45mg/body day8.15	21日	
非ホジキンリンパ腫	44	**FL モスネツズマブ皮下注 cycle2-8**	ルンスミオ皮下注 45mg/body day1	21日	8サイクル終了時に、完全奏効が得られた患者は投与を終了し、また、完全奏効がえられず部分奏効又は病変が不変だった患者は、計17サイクルまで投与を継続する。

【診療科：血液・腫瘍内科】

がん種		レジメン名	レジメン内容	インターバル	注意事項
非ホジキンリンパ腫	45	**FL モスネツズマブ皮下注 cycle9-17**	ルンスミオ皮下注 45mg/body day1	21日	8サイクル終了時に、完全奏効が得られた患者は投与を終了し、また、完全奏効がえられず部分奏効又は病変が不変だった患者は、計17サイクルまで投与を継続する。
非ホジキンリンパ腫	46	**Tafasitamab+R2 cycle1**	ミンジュビ 12mg/kg（注意事項参照） day1.8.15.22 リツキシマブBS 375mg/m2（注意事項参照） day2,8,15,22 レブラミド20mg/日(連日) day1-21	28日	ミンジュビ 溶解液が250mLの場合（42kg以上）は初回70mL/時で30分投与後に125mL/時にあげる。2回目以降は125mL/時に投与速度を固定する。溶解液100mLの場合（42kg未満）は投与速度は70mL/時に固定。 リツキシマブBS [1コース目] 50mL/hで開始、30分毎に50mL/hずつ速度を上げ、最大400mL/hまで [2回目以降] 100mL/hで開始、30分毎に100mL/hずつ速度を上げ、最大400mL/hまで [2回目以降] 臨床的に重篤な心疾患がなく、初回投与時に発現した副作用が軽微であり、かつ投与前の末梢血リンパ球数が5000/μL未満である場合、90分間で投与することができる。最初の30分で投与量の20%（100mL/hr）、その後60分で投与量の80%（200mL/hr）を投与
非ホジキンリンパ腫	47	**Tafasitamab+R2 cycle2-3**	ミンジュビ 12mg/kg（注意事項参照） day1.8.15.22 リツキシマブBS 375mg/m2（注意事項参照） day1 レブラミド20mg/日(連日) day1-21	28日	ミンジュビ 125mL/時に投与速度を固定する。溶解液100mLの場合（42kg未満）は投与速度は70mL/時に固定。 リツキシマブBS [1コース目] 50mL/hで開始、30分毎に50mL/hずつ速度を上げ、最大400mL/hまで [2回目以降] 100mL/hで開始、30分毎に100mL/hずつ速度を上げ、最大400mL/hまで [2回目以降] 臨床的に重篤な心疾患がなく、初回投与時に発現した副作用が軽微であり、かつ投与前の末梢血リンパ球数が5000/μL未満である場合、90分間で投与することができる。最初の30分で投与量の20%（100mL/hr）、その後60分で投与量の80%（200mL/hr）を投与
非ホジキンリンパ腫	48	**Tafasitamab+R2 cycle4-5**	ミンジュビ 12mg/kg（注意事項参照） day1.15 リツキシマブBS 375mg/m2（注意事項参照） day1 レブラミド20mg/日(連日) day1-21	28日	ミンジュビ 125mL/時に投与速度を固定する。溶解液100mLの場合（42kg未満）は投与速度は70mL/時に固定。 リツキシマブBS [1コース目] 50mL/hで開始、30分毎に50mL/hずつ速度を上げ、最大400mL/hまで [2回目以降] 100mL/hで開始、30分毎に100mL/hずつ速度を上げ、最大400mL/hまで [2回目以降] 臨床的に重篤な心疾患がなく、初回投与時に発現した副作用が軽微であり、かつ投与前の末梢血リンパ球数が5000/μL未満である場合、90分間で投与することができる。最初の30分で投与量の20%（100mL/hr）、その後60分で投与量の80%（200mL/hr）を投与

【診療科：血液・腫瘍内科】

がん種		レジメン名	レジメン内容	インターバル	注意事項
非ホジキンリンパ腫	49	**Tafasitamab+R2 cycle6-12**	ミンジュビ 12mg/kg（注意事項参照） day1.15 レブラミド20mg/日(連日) day1-21	28日	ミンジュビ 125mL/時に投与速度を固定する。溶解液100mLの場合（42kg未満）は投与速度は70mL/時に固定。
非ホジキンリンパ腫	50	**Acalabrutinib+BR**	リツキシマブBS 375mg/m2（注意事項参照） day1 ベンダムスチン 90mg/m2（10分） day1.2 カルケンス 100mg×2（内服） day1-28	28日	リツキシマブBS ［1コース目］ 50mL/hで開始、30分毎に50mL/hずつ速度を上げ、最大400mL/hまで ［ 2コース目以降］ 100mL/hで開始、30分毎に100mL/hずつ速度を上げ、最大400mL/hまで ［2コース目以降］ 臨床的に重篤な心疾患がなく、初回投与時に発現した副作用が軽微であり、かつ投与前の末梢血リンパ球数が5000/μL未満である場合、90分間で投与することができる。最初の30分で投与量の20%（100mL/hr）、その後60分で投与量の80%（200mL/hr）を投与
末梢性T細胞リンパ腫	1	**A+CHP**	ドキソルビシン 50mg/m2 (30分) day1 エンドキサン 750mg/m2 (30分) day1 アドセトリス 1.8mg/kg (30分) day1 プレドニン 100mg/body（内服） day1-5	21日	最大8コース
末梢性T細胞リンパ腫	2	**ロミデプシン**	イストダックス 14mg/m2 (4時間) day1,8,15	28日	
末梢性T細胞リンパ腫	3	**プララトレキサート**	ジフォルタ 30mg/m2 (5分) day1,8,15,22,29,36	49日	
末梢性T細胞リンパ腫	4	**デニロイキン ジフチトクス**	レミトロ 9μg/kg（1時間） day1,2,3,4,5	21日	

【診療科：血液・腫瘍内科】

がん種		レジメン名	レジメン内容	インターバル	注意事項
末梢性T細胞リンパ腫	5	**ダリナパルシン**	ダルビアス 300mg/m2（1時間） day1-5	21日	
ホジキンリンパ腫 末梢性T細胞リンパ腫	1	**ブレンツキシマブベドチン**	アドセトリス 1.8mg/kg（1時間） day1	21日	
ホジキンリンパ腫	2	**ABVD**	エクザール 6mg/m2（10分） day1,15 ドキソルビシン 25mg/m2（30分） day1,15 ブレオ 10mg/m2（30分） day1,15 ダカルバジン 375mg/m2（30分） day1,15	28日	6-8コース
ホジキンリンパ腫	3	**A-AVD**	エクザール 6mg/m2（10分） day1,15 ドキソルビシン 25mg/m2（30分） day1,15 ダカルバジン 375mg/m2（30分） day1,15 アドセトリス 1.2mg/kg（30分） day1,15	28日	最大6コース(12回)
ホジキンリンパ腫	4	**Nivolumab**	オプジーボ 240mg/body（30分） day1	14日	
ホジキンリンパ腫	5	**Nivolumab（4週）**	オプジーボ 480mg/body（30分） day1	28日	

【診療科：血液・腫瘍内科】

がん種		レジメン名	レジメン内容	インターバル	注意事項
ホジキンリンパ腫	6	**Pembrolizumab**	キイトルーダ 200mg/body（30分）day1	21日	
ホジキンリンパ腫	7	**Pembrolizumab（6週）**	キイトルーダ 400mg/body（30分）day1	42日	
骨髄異形成症候群	1	**アザシチジン**	ビダーザ 75mg/m2（10分点滴または皮下注）day1,2,3,4,5,6,7	28日	
多発性骨髄腫	1	**BD（2回/週）**	ボルテゾミブ 1.3mg/m2（皮下注または緩徐に静注）day1,4,8,11 レナデックス 20mg/body（内服）day1,2,4,5,8,9,11,12	21日	
多発性骨髄腫	2	**BD（1回/週）**	ボルテゾミブ 1.3mg/m2（皮下注または緩徐に静注）day1,8,15,22 レナデックス 20mg/body（内服）day1,2,8,9,15,16,22,23	35日	
多発性骨髄腫	3	**BLd**	ボルテゾミブ 1.3mg/m2（皮下注または緩徐に静注）day1,4,8,11 レブラミド 25mg/body （内服） day1-14 レナデックス 20mg/body（内服）day1,2,4,5,8,9,11,12	21日	

【診療科：血液・腫瘍内科】

がん種		レジメン名	レジメン内容	インターバル	注意事項
多発性骨髄腫	4	**BLd lite cycle1-9**	ボルテゾミブ 1.3mg/m2 (皮下注または緩徐に静注) day1,8,15,22 レブラミド 15mg/body （内服） day1-21 レナデックス 20mg/body (内服) day1,2,8,9,15,16,22,23	35日	75歳超の場合、レナデックスは20mg/body day1,8,15,22
多発性骨髄腫	5	**BLd lite cycle10以降**	ボルテゾミブ 1.3mg/m2 (皮下注または緩徐に静注) day1,15 レブラミド 15mg/body （内服） day1-21	28日	
多発性骨髄腫	6	**CyBorD**	エンドキサン 300mg/m2 (2時間) day1,8,15,22 ボルテゾミブ 1.3mg/m2 (皮下注) day1,8,15,22 レナデックス 40mg/body （内服） day1,8,15,22	28日	
多発性骨髄腫	7	**Kd cycle1**	カイプロリス 20mg/m2 (30分) day,1,2 カイプロリス 56mg/m2 (30分) day8,9,15,16 レナデックス 20mg/body (内服) day1,2,8,9,15,16,22,23	28日	
多発性骨髄腫	8	**Kd cycle2以降**	カイプロリス 56mg/m2 (30分) day1,2,8,9,15,16 レナデックス 20mg/body (内服) day1,2,8,9,15,16,22,23	28日	
多発性骨髄腫	9	**Kd 週1回 cycle1**	カイプロリス 20mg/m2 (30分) day,1 カイプロリス 70mg/m2 (30分) day8,15 レナデックス 40mg/body (内服) day1,8,15,22	28日	

【診療科：血液・腫瘍内科】

がん種		レジメン名	レジメン内容	インターバル	注意事項
多発性骨髄腫	10	**Kd 週1回　cycle2以降**	カイプロリス 70mg/m2（30分）day1,8,15 レナデックス 40mg/body（内服）day1,8,15,22	28日	
多発性骨髄腫	11	**KRd cycle1**	カイプロリス 20mg/m2（10分）day1,2, カイプロリス 27mg/m2（10分）day8,9,15,16 レナデックス 40mg/body（内服）day1,8,15,22 レブラミド 25mg/body （内服） day1-21	28日	
多発性骨髄腫	12	**KRd cycle2-12**	カイプロリス 27mg/m2（10分）day1,2,8,9,15,16 レナデックス 40mg/body（内服）day1,8,15,22 レブラミド 25mg/body （内服） day1-21	28日	
多発性骨髄腫	13	**KRd cycle13以降**	カイプロリス 27mg/m2（10分）day1,2,15,16 レナデックス 40mg/body（内服）day1,8,15,22 レブラミド 25mg/body （内服） day1-21	28日	
多発性骨髄腫	14	**ELd 1,2cycle**	エムプリシティ 10mg/kg（注意事項参照）day1,8,15,22 レナデックス 28mg/body（内服）day1,8,15,22 レブラミド 25mg/body （内服） day1-21 デキサート 6.6mg/body day1,8,15,22	28日	エムプリシティ ［1コース目day1］ 30mL/hで開始、開始30分後に60mL/h、開始1時間後に120mL/h ［1コース目day8］ 180mL/hで開始、開始30分後に240mL/h ［1コース目day15，22、2コース目］ 300mL/h
多発性骨髄腫	15	**ELd 3cycle以降**	エムプリシティ 10mg/kg（300mL/h）day1,15 レナデックス 28mg/body（内服）day1,15 レナデックス 40mg/body（内服）day8,22 レブラミド 25mg/body （内服） day1-21 デキサート 6.6mg/body day1,15	28日	

【診療科：血液・腫瘍内科】

がん種		レジメン名	レジメン内容	インターバル	注意事項
多発性骨髄腫	16	**EPd 1,2cycle**	エムプリシティ 10mg/kg（注意事項参照）day1,8,15,22 レナデックス 28mg/body（内服）day1,8,15,22 ポマリスト 4mg/body （内服） day1-21 デキサート 6.6mg/body day1,8,15,22	28日	エムプリシティ ［1コース目day1］ 30mL/hで開始、開始30分後に60mL/h、開始1時間後に120mL/h ［1コース目day8］ 180mL/hで開始、開始30分後に240mL/h ［1コース目day15, 22、2コース目］ 300mL/h ※75歳を超える場合は、レナデックスは8mg
多発性骨髄腫	17	**EPd 3cycle以降**	エムプリシティ 20mg/kg（注意事項参照）day1 レナデックス 28mg/body（内服）day1 レナデックス 40mg/body（内服）day8,15,22 ポマリスト 4mg/body （内服） day1-21 デキサート 6.6mg/body day1	28日	エムプリシティ ［3コース目］ 180mL/hで開始、開始30分後に240mL/h ［4コース目以降］ 300mL/h ※75歳を超える場合は、レナデックスは8mg(day1),20mg(day8,15,22)
多発性骨髄腫	18	**DVRd（移植非適応） cycle1,2**	ダラキューロ 1800mg（皮下注）day1,8,15 ボルテゾミブ 1.3mg/m2（皮下注）day1,4,8,11 レブラミド 25mg/body （内服） day1-14 レナデックス 20mg/body（内服）day1,2,4,5,8,911,12,15	21日	レナデックスは、75歳を超える又は過少体重（BMI：18.5kg/m2未満）の患者には20mgをday1,4,8,11,15へ減量
多発性骨髄腫	19	**DVRd（移植非適応） cycle3-8**	ダラキューロ 1800mg（皮下注）day1 ボルテゾミブ 1.3mg/m2（皮下注）day1,4,8,11 レブラミド 25mg/body （内服） day1-14 レナデックス 20mg/body（内服）day1,2,4,5,8,911,12	21日	レナデックスは、75歳を超える又は過少体重（BMI：18.5kg/m2未満）の患者には20mgをday1,4,8,11へ減量
多発性骨髄腫	20	**DVRd（移植非適応） cycle9以降**	ダラキューロ 1800mg（皮下注）day1 レブラミド 25mg/body （内服） day1-21 レナデックス 40mg/body（内服）day1,8,15,22	28日	レナデックスは、75歳を超える又は過少体重（BMI：18.5kg/m2未満）の患者には20mgをday1,8,15,22へ減量
多発性骨髄腫	21	**DVRd（移植適応） cycle1**	ダラキューロ 1800mg（皮下注）day1,8,15,22 ボルテゾミブ 1.3mg/m2（皮下注）day1,4,8,11 レブラミド 25mg/body （内服） day1-21 レナデックス 40mg/body（内服）day1,2,3.4,9,10,11,12 デカドロン 20mg/body（内服）day8 デカドロン 8mg/body（内服）day15,22	28日	レブラミド25mg/日　day1-21 Ccr50mL/min以上の患者は1～6サイクル目は25mg/日を、7サイクル目以降は10mg/日を投与する。 Ccr30～49mL/minの患者は1～6サイクル目は10mg/日を、7サイクル目以降は5mg/日を経口投与する。

【診療科：血液・腫瘍内科】

がん種		レジメン名	レジメン内容	インターバル	注意事項
多発性骨髄腫	22	**DVRd（移植適応） cycle2**	ダラキューロ 1800mg（皮下注）day1,8,15,22 ボルテゾミブ 1.3mg/m2（皮下注）day1,4,8,11 レブラミド 25mg/body（内服） day1-21 レナデックス 40mg/body（内服）day1,2,3.4,9,10,11,12 デカドロン 8mg/body（内服）day8,15,22	28日	レブラミド25mg/日　day1-21 Ccr50mL/min以上の患者は1～6サイクル目は25mg/日を、7サイクル目以降は10mg/日を投与する。 Ccr30～49mL/minの患者は1～6サイクル目は10mg/日を、7サイクル目以降は5mg/日を経口投与する。
多発性骨髄腫	23	**DVRd（移植適応） cycle3-6**	ダラキューロ 1800mg（皮下注）day1,15 ボルテゾミブ 1.3mg/m2（皮下注）day1,4,8,11 レブラミド 25mg/body（内服） day1-21 レナデックス 40mg/body（内服）day1,2,3,4,9,10,11,12 デカドロン 8mg/body（内服）day15	28日	レブラミド25mg/日　day1-21 Ccr50mL/min以上の患者は1～6サイクル目は25mg/日を、7サイクル目以降は10mg/日を投与する。 Ccr30～49mL/minの患者は1～6サイクル目は10mg/日を、7サイクル目以降は5mg/日を経口投与する。
多発性骨髄腫	24	**DVRd（移植適応） cycle7以降**	ダラキューロ 1800mg（皮下注）day1 レブラミド 10mg/body（内服） day1-28 デカドロン 8mg/body（内服）day1	28日	レブラミド10mg/日　day1-28 Ccr50mL/min以上の患者は1～6サイクル目は25mg/日を、7サイクル目以降は10mg/日を投与する。 Ccr30～49mL/minの患者は1～6サイクル目は10mg/日を、7サイクル目以降は5mg/日を経口投与する。
多発性骨髄腫	25	**DBd cycle1-3**	ボルテゾミブ 1.3mg/m2（緩徐に静注）day1,4,8,11 ダラザレックス 16mg/kg（注意事項参照）day1,8,15 デキサート 19.8mg/body　day1,8,15 レナデックス 20mg/body（内服）day2,4,5,9,11,12	21日	ダラザレックス ［1コース目day1,8］ 50mL/hで開始、1時間毎に50mL/hずつ速度を上げ、最大200mL/hまで ［1コース目day15、2コース目以降］ 100mL/hで開始、1時間毎に50mL/hずつ速度を上げ、最大200mL/hまで 75歳を超える、過小体重(BMI<18.5)、コントロール不良の糖尿病、又はステロイド療法に対する忍容性がない若しくは有害事象を発現した患者の場合は、レナデックス20mg/週で投与可
多発性骨髄腫	26	**DBd cycle4-8**	ボルテゾミブ 1.3mg/m2（緩徐に静注）day1,4,8,11 ダラザレックス 16mg/kg（注意事項参照）day1 デキサート 19.8mg/body　day1 レナデックス 20mg/body（内服）day2,4,5,8,9,11,12	21日	ダラザレックス 100mL/hで開始、1時間毎に50mL/hずつ速度を上げ、最大200mL/hまで 75歳を超える、過小体重(BMI<18.5)、コントロール不良の糖尿病、又はステロイド療法に対する忍容性がない若しくは有害事象を発現した患者の場合は、レナデックス20mg/週で投与可
多発性骨髄腫	27	**DBd cycle9以降**	ダラザレックス 16mg/kg（注意事項参照）day1 デキサート19.8mg/body day1	28日	ダラザレックス 100mL/hで開始、1時間毎に50mL/hずつ速度を上げ、最大200mL/hまで

【診療科：血液・腫瘍内科】

がん種		レジメン名	レジメン内容	インターバル	注意事項
多発性骨髄腫	28	**DBd皮下注 cycle1-3**	ボルテゾミブ 1.3mg/m2（皮下注）day1,4,8,11 ダラキューロ 1800mg（皮下注）day1,8,15 レナデックス 20mg/body（内服）day1,2,4,5,8,9,11,12,15	21日	75歳を超える、過小体重(BMI<18.5)、コントロール不良の糖尿病、又はステロイド療法に対する忍容性がない若しくは有害事象を発現した患者の場合は、レナデックス20mg/週へ減量可能
多発性骨髄腫	29	**DBd皮下注 cycle4-8**	ボルテゾミブ 1.3mg/m2（皮下注）day1,4,8,11 ダラキューロ 1800mg（皮下注）day1 レナデックス 20mg/body（内服）day1,2,4,5,8,9,11,12	21日	75歳を超える、過小体重(BMI<18.5)、コントロール不良の糖尿病、又はステロイド療法に対する忍容性がない若しくは有害事象を発現した患者の場合は、レナデックス20mg/週へ減量可能
多発性骨髄腫	30	**DBd皮下注 cycle9以降**	ダラキューロ 1800mg（皮下注）day1 レナデックス 20mg/body（内服）day1	28日	75歳を超える、過小体重(BMI<18.5)、コントロール不良の糖尿病、又はステロイド療法に対する忍容性がない若しくは有害事象を発現した患者の場合は、レナデックス20mg/週へ減量可能
多発性骨髄腫	31	**DLd cycle1-2**	ダラザレックス 16mg/kg（注意事項参照）day,1,8,15,22 デキサート 19.8mg　day1,8,15,22 レナデックス 20mg/body（内服）day2,9,16,23 レブラミド 25mg/body　（内服）day1-21	28日	ダラザレックス ［1コース目day1,8］ 50mL/hで開始、1時間毎に50mL/hずつ速度を上げ、最大200mL/hまで ［1コース目day15,22、2コース目］ 100mL/hで開始、1時間毎に50mL/hずつ速度を上げ、最大200mL/hまで 75歳を超える、過小体重(BMI<18.5)患者の場合は、レナデックス20mg/週へ減量可能
多発性骨髄腫	32	**DLd cycle3-6**	ダラザレックス 16mg/kg（注意事項参照）day,1,15 デキサート 19.8mg　day1,15 レナデックス 20mg/body（内服）day2,16 レナデックス 40mg/body（内服）day8,22 レブラミド 25mg/body　（内服）day1-21	28日	ダラザレックス 100mL/hで開始、1時間毎に50mL/hずつ速度を上げ、最大200mL/hまで 75歳を超える、過小体重(BMI<18.5)患者の場合は、レナデックス20mg/週へ減量可能
多発性骨髄腫	33	**DLd cycle7以降**	ダラザレックス 16mg/kg（注意事項参照）day,1 デキサート 19.8mg　day1 レナデックス 20mg/body（内服）day2 レナデックス 40mg/body（内服）day8,22 レブラミド 25mg/body　（内服）day1-21	28日	ダラザレックス 100mL/hで開始、1時間毎に50mL/hずつ速度を上げ、最大200mL/hまで 75歳を超える、過小体重(BMI<18.5)患者の場合は、レナデックス20mg/週へ減量可能

【診療科：血液・腫瘍内科】

がん種		レジメン名	レジメン内容	インターバル	注意事項
多発性骨髄腫	34	**DLd皮下注 cycle1-2**	ダラキューロ 1800mg（皮下注）day1,8,15,22 レナデックス 20mg/body（内服）day1,2,8,9,15,16,22,23 レブラミド 25mg/body （内服） day1-21	28日	75歳を超える、過小体重(BMI<18.5)患者の場合は、レナデックス20mg/週へ減量可能
多発性骨髄腫	35	**DLd皮下注 cycle3-6**	ダラキューロ 1800mg（皮下注）day1,15 レナデックス 20mg/body（内服）day1,2,15,16 レナデックス 40mg/body（内服）day8,22 レブラミド 25mg/body （内服） day1-21	28日	75歳を超える、過小体重(BMI<18.5)患者の場合は、レナデックス20mg/週へ減量可能
多発性骨髄腫	36	**DLd皮下注 cycle7以降**	ダラキューロ 1800mg（皮下注）day1 レナデックス 20mg/body（内服）day1,2 レナデックス 40mg/body（内服）day8,15,22 レブラミド 25mg/body （内服） day1-21	28日	75歳を超える、過小体重(BMI<18.5)患者の場合は、レナデックス20mg/週へ減量可能
多発性骨髄腫	37	**DMPB cycle1**	ボルテゾミブ 1.3mg/m2（皮下注）day1,4,8,11,22,25,29,32 ダラザレックス 16mg/kg（注意事項参照）day1,8,15,22,29,36 アルケランp.o 9mg/m2 （内服） day1-4 プレドニンp.o 60mg/m2（内服）day2-4 デキサート19.8mg/body day1,8,15,22,29,36	42日	ダラザレックス [1コース目day1,8] 50mL/hで開始、1時間毎に50mL/hずつ速度を上げ、最大200mL/hまで [1コース目day15以降] 100mL/hで開始、1時間毎に50mL/hずつ速度を上げ、最大200mL/hまで
多発性骨髄腫	38	**DMPB cycle2-9**	ボルテゾミブ 1.3mg/m2（皮下注）day1,8,22,29 ダラザレックス 16mg/kg（注意事項参照）day1,22 アルケランp.o 9mg/m2 （内服） day1-4 プレドニンp.o 60mg/m2（内服）day2-4 デキサート19.8mg/body day1,22	42日	ダラザレックス 100mL/hで開始、1時間毎に50mL/hずつ速度を上げ、最大200mL/hまで
多発性骨髄腫	39	**DMPB cycle10以降**	ダラザレックス 16mg/kg（注意事項参照）day1 デキサート19.8mg/body day1	28日	ダラザレックス 100mL/hで開始、1時間毎に50mL/hずつ速度を上げ、最大200mL/hまで

【診療科：血液・腫瘍内科】

がん種		レジメン名	レジメン内容	インターバル	注意事項
多発性骨髄腫	40	**DMPB皮下注 cycle1**	ボルテゾミブ 1.3mg/m2（皮下注）day1,4,8,11,22,25,29,32 ダラキューロ 1800mg（皮下注）day1,8,15,22,29,36 アルケランp.o 9mg/m2 （内服） day1-4 プレドニンp.o 60mg/m2（内服）day2-4 レナデックス20mg/body（内服）day1,8,15,22,29,36	42日	
多発性骨髄腫	41	**DMPB皮下注 cycle2-9**	ボルテゾミブ 1.3mg/m2（皮下注）day1,8,22,29 ダラキューロ 1800mg（皮下注）day1,22 アルケランp.o 9mg/m2 （内服） day1-4 プレドニンp.o 60mg/m2（内服）day2-4 レナデックス20mg/body（内服）day1,22	42日	
多発性骨髄腫	42	**DMPB皮下注 cycle10以降**	ダラキューロ 1800mg（皮下注）day1 レナデックス20mg/body（内服）day1	28日	
多発性骨髄腫	43	**DCd cycle1**	カイプロリス 20mg/m2（30分）day1,2 カイプロリス 56mg/m2（30分）day8,9,15,16 ダラザレックス 16mg/kg（50mL/hr）day1,8,15,22 デキサート 19.8mg/body（30分）day1,2,8,9,15,16 デキサート 39.6mg/body（60分）day22	28日	75歳を超える場合 デキサート 19.8mg/body（30分）day1,2,8,15 デキサート 8.25mg/body（30分）day2,9,16 デキサート 19.8mg/body（60分）day22
多発性骨髄腫	44	**DCd cycle2**	カイプロリス 56mg/m2（30分）day1,2,8,9,15,16 ダラザレックス 16mg/kg（50mL/hr）day1,8,15,22 デキサート 19.8mg/body（30分）day1,2,8,9,15,16 デキサート 39.6mg/body（60分）day22	28日	75歳を超える場合 デキサート 19.8mg/body（30分）day1,8,15 デキサート 19.8mg/body（60分）day22
多発性骨髄腫	45	**DCd cycle3-6**	カイプロリス 56mg/m2（30分）day1,2,8,9,15,16 ダラザレックス 16mg/kg（50mL/hr）day1,15 デキサート 19.8mg/body（30分）day1,2,8,9,15,16 レナデックス 40mg/body（内服）day22	28日	75歳を超える場合 デキサート 19.8mg/body（30分）day1,15 デキサート 11.55mg/body（30分）day8 デキサート 8.25mg/body（30分）day9 レナデックス 20mg/body（内服）day22

【診療科：血液・腫瘍内科】

がん種		レジメン名	レジメン内容	インターバル	注意事項
多発性骨髄腫	46	**DCd cycle7以降**	カイプロリス 56mg/m2 (30分) day1,2,8,9,15,16 ダラザレックス 16mg/kg (50mL/hr) day1,15 デキサート 19.8mg/body (30分) day1,2,8,9,15,16 レナデックス 40mg/body (内服) day22	28日	75歳を超える場合 デキサート 19.8mg/body (30分) day1 デキサート 11.55mg/body (30分) day8,15 デキサート 8.25mg/body (30分) day9,16 レナデックス 20mg/body (内服) day22
多発性骨髄腫	47	**DCd皮下注 cycle1**	カイプロリス 20mg/m2 (30分) day1,2 カイプロリス 56mg/m2 (30分) day8,9,15,16 ダラキューロ 1800mg (皮下注) day1,8,15,22 デキサート 19.8mg/body (30分) day1,2,8,9,15,16 レナデックス 40mg/body (内服) day22	28日	75歳を超える場合 デキサート 19.8mg/body (30分) day1,2,8,15 レナデックス 20mg/body (内服) day22
多発性骨髄腫	48	**DCd皮下注 cycle2**	カイプロリス 56mg/m2 (30分) day1,2,8,9,15,16 ダラキューロ 1800mg (皮下注) day1,8,15,22 デキサート 19.8mg/body (30分) day1,2,8,9,15,16 レナデックス 40mg/body (内服) day22	28日	75歳を超える場合 デキサート 19.8mg/body (30分) day1,8,15 レナデックス 20mg/body (内服) day22
多発性骨髄腫	49	**DCd皮下注 cycle3-6**	カイプロリス 56mg/m2 (30分) day1,2,8,9,15,16 ダラキューロ 1800mg (皮下注) day1,15 デキサート 19.8mg/body (30分) day1,2,8,9,15,16 レナデックス 40mg/body (内服) day22	28日	75歳を超える場合 デキサート 19.8mg/body (30分) day1,15 デキサート 11.55mg/body (30分) day8 デキサート 8.25mg/body (30分) day9 レナデックス 20mg/body (内服) day22
多発性骨髄腫	50	**DCd皮下注 cycle7以降**	カイプロリス 56mg/m2 (30分) day1,2,8,9,15,16 ダラキューロ 1800mg (皮下注) day1 デキサート 19.8mg/body (30分) day1,2,8,9,15,16 レナデックス 40mg/body (内服) day22	28日	75歳を超える場合 デキサート 19.8mg/body (30分) day1 デキサート 11.55mg/body (30分) day8,15 デキサート 8.25mg/body (30分) day9,16 レナデックス 20mg/body (内服) day22
多発性骨髄腫	51	**DPd皮下注 cycle1-2**	ダラキューロ 1800mg (皮下注) day1,8,15,22 レナデックス 20mg/body (内服) day1,2,8,9,15,16,22,23 ポマリスト 4mg/body （内服） day1-21	28日	75歳以上患者の場合は、レナデックス20mg/週へ減量

【診療科：血液・腫瘍内科】

がん種		レジメン名	レジメン内容	インターバル	注意事項
多発性骨髄腫	52	**DPd皮下注 cycle3-6**	ダラキューロ 1800mg（皮下注）day1,15 レナデックス 20mg/body（内服）day1,2,15,16 レナデックス 40mg/body（内服）day8,22 ポマリスト 4mg/body （内服） day1-21	28日	75歳以上患者の場合は、レナデックス20mg/週へ減量
多発性骨髄腫	53	**DPd皮下注 cycle7以降**	ダラキューロ 1800mg（皮下注）day1 レナデックス 20mg/body（内服）day1,2 レナデックス 40mg/body（内服）day8,15,22 ポマリスト 4mg/body （内服） day1-21	28日	75歳以上患者の場合は、レナデックス20mg/週へ減量
多発性骨髄腫	54	**ダラツムマブ cycle1,2**	ダラキューロ 1800mg（皮下注）day1.8.15.22	28日	最長39サイクル、36か月または疾患進行のいずれか早い時点まで投与継続する
多発性骨髄腫	55	**ダラツムマブ cycle3-6**	ダラキューロ 1800mg（皮下注）day1.15	28日	最長39サイクル、36か月または疾患進行のいずれか早い時点まで投与継続する
多発性骨髄腫	56	**ダラツムマブ cycle7-**	ダラキューロ 1800mg（皮下注）day1	28日	最長39サイクル、36か月または疾患進行のいずれか早い時点まで投与継続する
多発性骨髄腫	57	**IsaVRd cycle1**	サークリサ 10mg/kg（注意事項参照）day1,8,15,22,29 ボルテゾミブ 1.3mg/m2（皮下注）day1,4,8,11,22,25,29,32 デキサート 19.8mg/body（30分）day1,8,15,22,29 レナデックス 20mg/body(内服）day2,4,5,9,11,12,23,25,26,30,32,33 レブラミド 25mg/body(内服）day1-14,22-35	42日	サークリサ 初回：0-60分 25mL/hr、60-90分 50mL/hr、90-120分 75mL/hr、120-150分 100mL/hr、150-180分 125mL/hr、180分以降 150mL/hr 2回目：0-30分 50mL/hr、30-60分 100mL/hr、60分以降 200mL/hr 3回目以降：200mL/hr 75歳以上患者の場合、デキサメタゾンをday1,4,8,11,15,22,25,29,32に投与

【診療科：血液・腫瘍内科】

がん種		レジメン名	レジメン内容	インターバル	注意事項
多発性骨髄腫	58	**IsaVRd cycle2-4**	サークリサ 10mg/kg (200mL/hr) day1,15,29 ボルテゾミブ 1.3mg/m2 (皮下注) day1,4,8,11,22,25,29,32 デキサート 19.8mg/body (30分) day1,15,29 レナデックス 20mg/body(内服) day2,4,5,8,9,11,12,22,23,25,26,30,32,33 レブラミド 25mg/body(内服) day1-14,22-35	42日	75歳以上患者の場合、デキサメタゾンをday1,4,8,11,15,22,25,29,32に投与
多発性骨髄腫	59	**IsaVRd cycle5-17**	サークリサ 10mg/kg (200mL/hr) day1,15 デキサート 19.8mg/body (30分) day1,15 レナデックス 20mg/body(内服) day8,22 レブラミド 25mg/body(内服) day1-21	28日	
多発性骨髄腫	60	**IsaVRd c18以降**	サークリサ 10mg/kg (200mL/hr) day1 デキサート 19.8mg/body (30分) day1 レナデックス 20mg/body(内服) day8,15,22 レブラミド 25mg/body(内服) day1-21	28日	
多発性骨髄腫	61	**IsaVRd(BENEFIT) cycle1**	サークリサ 10mg/kg (注意事項参照) day1,8,15,22 ボルテゾミブ 1.3mg/m2 (皮下注) day1,8,15 デキサート 19.8mg/body (30分) day1,8,15,22 レブラミド 25mg/body(内服) day1-21	28日	サークリサ 初回：0-60分 25mL/hr、60-90分 50mL/hr、90-120分 75mL/hr、120-150分 100mL/hr、150-180分 125mL/hr、180分以降 150mL/hr 2回目：0-30分 50mL/hr、30-60分 100mL/hr、60分以降 200mL/hr 3回目以降：200mL/hr
多発性骨髄腫	62	**IsaVRd(BENEFIT) cycle2-12**	サークリサ 10mg/kg (200mL/hr) day1,15 ボルテゾミブ 1.3mg/m2 (皮下注) day1,8,15 デキサート 19.8mg/body (30分) day1,15 レナデックス 20mg/body(内服) day8,22 レブラミド 25mg/body(内服) day1-21	28日	
多発性骨髄腫	63	**IsaVRd(BENEFIT) cycle13-18**	サークリサ 10mg/kg (200mL/hr) day1 ボルテゾミブ 1.3mg/m2 (皮下注) day1,15 デキサート 19.8mg/body (30分) day1 レブラミド 25mg/body(内服) day1-21	28日	

【診療科：血液・腫瘍内科】

がん種		レジメン名	レジメン内容	インターバル	注意事項
多発性骨髄腫	64	**IsaVRd(BENEFIT) cycle19以降**	サークリサ 10mg/kg (200mL/hr) day1 レブラミド 25mg/body(内服) day1-21	28日	
多発性骨髄腫	65	**IsaPd cycle1**	サークリサ 10mg/kg (注意事項参照) day1,8,15,22 ポマリスト 4mg（内服） day1-21 デキサート 39.6mg/body day1,8,15,22	28日	サークリサ 初回：0-60分 25mL/hr、60-90分 50mL/hr、90-120分 75mL/hr、120-150分 100mL/hr、150-180分 125mL/hr、180分以降 150mL/hr 2回目：0-30分 50mL/hr、30-60分 100mL/hr、60分以降 200mL/hr 3回目以降：200mL/hr 75歳以上患者の場合は、デキサート19.8mg/週へ減量
多発性骨髄腫	66	**IsaPd cycle2以降**	サークリサ 10mg/kg (200mL/hr) day1,15 ポマリスト 4mg（内服） day1-21 デキサート 39.6mg/body day1,15 レナデックス 40mg/body day8,22	28日	75歳以上患者の場合は、デキサート19.8mg、レナデックス20mgへ減量
多発性骨髄腫	67	**IsaKd cycle1**	サークリサ 10mg/kg (注意事項参照) day1,8,15,22 カイプロリス 20mg/m2 (30分) day,1,2 カイプロリス 56mg/m2 (30分) day8,9,15,16 デキサート 19.8mg/body (30分) day1,2,8,9,15,16,22 レナデックス 20mg/body（内服） day23	28日	サークリサ 初回：0-60分 25mL/hr、60-90分 50mL/hr、90-120分 75mL/hr、120-150分 100mL/hr、150-180分 125mL/hr、180分以降 150mL/hr 2回目：0-30分 50mL/hr、30-60分 100mL/hr、60分以降 200mL/hr 3回目以降：200mL/hr
多発性骨髄腫	68	**IsaKd cycle2以降**	サークリサ 10mg/kg (200mL/hr) day1,15 カイプロリス 56mg/m2 (30分) day1,2,8,9,15,16 デキサート 19.8mg/body (30分) day1,2,8,9,15,16 レナデックス 20mg/body（内服） day22,23	28日	
多発性骨髄腫	69	**Isa+d cycle1**	サークリサ 20mg/kg (注意事項参照) day1,8,15,22 デキサート 39.6mg/body (30分) day1,8,15,22	28日	サークリサ 初回：0-60分 25mL/hr、60-90分 50mL/hr、90-120分 75mL/hr、120-150分 100mL/hr、150-180分 125mL/hr、180分以降 150mL/hr 2回目：0-30分 50mL/hr、30-60分 100mL/hr、60分以降 200mL/hr 3回目以降：200mL/hr 75歳以上患者の場合は、デキサート19.8mg/週へ減量

【診療科：血液・腫瘍内科】

がん種		レジメン名	レジメン内容	インターバル	注意事項
多発性骨髄腫	70	**Isa+d cycle2以降**	サークリサ 20mg/kg（200mL/hr）day1,15 デキサート 39.6mg/body（30分）day1,15 レナデックス 40mg/body（内服） day8,22	28日	75歳以上患者の場合は、デキサート19.8mg/週、レナデックス20mg/週へ減量
多発性骨髄腫	71	**Isa単剤 cycle1**	サークリサ 20mg/kg（注意事項参照）day1,8,15,22	28日	サークリサ 初回：0-60分 25mL/hr、60-90分 50mL/hr、90-120分 75mL/hr、120-150分 100mL/hr、150-180分 125mL/hr、180分以降 150mL/hr 2回目：0-30分 50mL/hr、30-60分 100mL/hr、60分以降 200mL/hr 3回目以降：200mL/hr
多発性骨髄腫	72	**Isa単剤 cycle2以降**	サークリサ 20mg/kg（200mL/hr）day1,15	28日	
多発性骨髄腫	73	**エルラナタマブ(1,2週目)**	エルレフィオ 12mg/body(皮下注) day1 エルレフィオ 32mg/body(皮下注) day4 エルレフィオ 76mg/body(皮下注) day8	14日	
多発性骨髄腫	74	**エルラナタマブ(3-24週目)**	エルレフィオ 76mg/body(皮下注) day1	7日	
多発性骨髄腫	75	**エルラナタマブ(25週目以降)**	エルレフィオ 76mg/body(皮下注) day1	14日	

【診療科：血液・腫瘍内科】

がん種		レジメン名	レジメン内容	インターバル	注意事項
多発性骨髄腫	76	**トアルクエタマブ A法（漸増期）**	タービー 0.01mg/kg（皮下注）day1 タービー 0.06mg/kg（皮下注）day3 タービー 0.4mg/kg（皮下注）day5	11日	
多発性骨髄腫	77	**トアルクエタマブ A法（継続投与期）**	タービー 0.4mg/kg（皮下注）day1	7日	
多発性骨髄腫	78	**トアルクエタマブ B法（漸増期）**	タービー 0.01mg/kg（皮下注）day1 タービー 0.06mg/kg（皮下注）day3 タービー 0.4mg/kg（皮下注）day5 タービー 0.8mg/kg（皮下注）day7	20日	
多発性骨髄腫	79	**トアルクエタマブ B法（継続投与期）**	タービー 0.8mg/kg（皮下注）day1	14日	
多発性骨髄腫	80	**テクリスタマブ（漸増期）**	テクベイリ 0.06mg/kg（皮下注） day1 テクベイリ 0.3mg/kg（皮下注） day4 テクベイリ 1.5mg/kg（皮下注） day7	14日	
多発性骨髄腫	81	**テクリスタマブ（継続投与期）**	テクベイリ 1.5mg/kg（皮下注） day1	7日	

【診療科：血液・腫瘍内科】

がん種		レジメン名	レジメン内容	インターバル	注意事項
多発性骨髄腫	82	**Talquetamab+Teclistamab（漸増期）**	テクベイリ 0.06mg/kg（皮下注） day1 テクベイリ 0.3mg/kg（皮下注） day4 テクベイリ 1.5mg/kg（皮下注） day7 テクベイリ 3mg/kg（皮下注） day10 タービー 0.01mg/kg（皮下注） day1 タービー 0.06mg/kg（皮下注） day4 タービー 0.4mg/kg（皮下注） day7 タービー 0.8mg/kg（皮下注） day10	23日	
多発性骨髄腫	83	**Talquetamab+Teclistamab （継続投与期2週毎）**	テクベイリ 3mg/kg（皮下注） day1 タービー 0.8mg/kg（皮下注） day1	14日	
多発性骨髄腫	84	**Talquetamab+Teclistamab （15or23週目以降4週毎）**	テクベイリ 3mg/kg（皮下注） day1 タービー 0.8mg/kg（皮下注） day1	28日	
多発性骨髄腫	85	**BelaVd c1-8**	ブーレンレップ 2.5mg/kg（30分） day1 ボルテゾミブ 1.3mg/m2（皮下注） day1.4.8.11 レナデックス 20mg（内服） day1.2.4.5.8.9.11.12	21日	防腐剤を含まない人工涙液を1 日4回以上投与 眼科医との連携の下で使用し、投与開始前に眼科医による診察をする 初回から4 回目までの各投与前は必ず、その後の投与期間中は必要に応じて、眼科医による視力検査及び細隙灯顕微鏡検査を含む眼科検査を実施する 75歳を超える、BMIが18.5kg/m2未満、糖質コルチコイド療法に関連する許容できない副作用の既往を有する、またはデキサメタゾンの開始用量に忍容性がない場合は、医師の判断で開始用量を10mgに減量可能とする。
多発性骨髄腫	86	**BelaVd c9以降**	ブーレンレップ 2.5mg/kg（30分） day1	21日	防腐剤を含まない人工涙液を1 日4回以上投与 眼科医との連携の下で使用し、投与開始前に眼科医による診察をする 初回から4 回目までの各投与前は必ず、その後の投与期間中は必要に応じて、眼科医による視力検査及び細隙灯顕微鏡検査を含む眼科検査を実施する
多発性骨髄腫	87	**BelaPd c1**	ブーレンレップ 2.5mg/kg（30分） day1 レナデックス 40mg（内服） day1,8,15,22 ポマリスト 4mg（内服） day1-21	28日	防腐剤を含まない人工涙液を1 日4回以上投与 眼科医との連携の下で使用し、投与開始前に眼科医による診察をする 初回から4 回目までの各投与前は必ず、その後の投与期間中は必要に応じて、眼科医による視力検査及び細隙灯顕微鏡検査を含む眼科検査を実施する 75歳を超える、併存疾患を有する、糖質コルチコイド療法に関連する許容できない副作用の既往を有する、またはデキサメタゾンの開始用量に忍容性がない場合は、治療責任医師の判断で開始用量を20mgに減量可能とする。

【診療科：血液・腫瘍内科】

がん種		レジメン名	レジメン内容	インターバル	注意事項
多発性骨髄腫	88	**BelaPd c2以降**	ブーレンレップ 1.9mg/kg（30分） day1 レナデックス 40mg（内服） day1,8,15,22 ポマリスト 4mg（内服） day1-21	28日	防腐剤を含まない人工涙液を1 日4回以上投与 眼科医との連携の下で使用し、投与開始前に眼科医による診察をする 初回から4 回目までの各投与前は必ず、その後の投与期間中は必要に応じて、眼科医による視力検査及び細隙灯顕微鏡検査を含む眼科検査を実施する 75歳を超える、併存疾患を有する、糖質コルチコイド療法に関連する許容できない副作用の既往を有する、またはデキサメタゾンの開始用量に忍容性がない場合は、治療責任医師の判断で開始用量を20mgに減量可能とする。
全身性アミロイドーシス	1	**DCyBorD cycle1-2**	ダラキューロ 1800mg（皮下注）day1,8,15,22 エンドキサン 300mg/m2（点滴）day1,8,15,22 ベルケイド 1.3mg/m2（皮下注）day1,8,15,22 デカドロン 20mg/body （内服） day1,2,8,9,15,16,22,23	28日	
全身性アミロイドーシス	2	**DCyBorD cycle3-6**	ダラキューロ 1800mg（皮下注）day1,15 エンドキサン 300mg/m2（2時間）day1,8,15,22 ベルケイド 1.3mg/m2（皮下注）day1,8,15,22 デカドロン 20mg/body （内服） day1,2,15,16 デカドロン 40mg/body （内服） day8,22	28日	
全身性アミロイドーシス	3	**DCyBorD cycle7以降**	ダラキューロ 1800mg（皮下注）day1 デカドロン 20mg/body（内服）day1	28日	
急性骨髄性白血病	1	**アザシチジン**	ビダーザ 75mg/m2（10分点滴または皮下注）day1,2,3,4,5,6,7	28日	
急性骨髄性白血病	2	**アザシチジン+ベネトクラクス**	ビダーザ 75mg/m2（10分または皮下注）day1,2,3,4,5,6,7 ベネクレクスタ(内服：添付文書参照)	28日	

【診療科：血液・腫瘍内科】

がん種		レジメン名	レジメン内容	インターバル	注意事項
慢性リンパ性白血病	1	**リツキシマブ（初回）＋ベネトクラクス**	リツキサン　375mg/m2（注意事項参照）day1 ベネクレクスタ(内服：添付文書参照)	28日	[1コース目] 50mL/hで開始、30分毎に50mL/hずつ速度を上げ、最大400mL/hまで [2コース目以降] 100mL/hで開始、30分毎に100mL/hずつ速度を上げ、最大400mL/hまで
慢性リンパ性白血病	2	**リツキシマブ（2回目以降）＋ベネトクラクス**	リツキサン　500mg/m2（注意事項参照）day1 ベネクレクスタ(内服：添付文書参照)	28日	初回含め最大6コース [1コース目] 50mL/hで開始、30分毎に50mL/hずつ速度を上げ、最大400mL/hまで [2コース目以降] 100mL/hで開始、30分毎に100mL/hずつ速度を上げ、最大400mL/hまで
悪性黒色腫	1	**Nivolumab**	オプジーボ 240mg/body（30分）day1	14日	
悪性黒色腫	2	**Nivolumab（4週）**	オプジーボ 480mg/body（30分）day1	28日	
悪性黒色腫	3	**Pembrolizimab**	キイトルーダ 200mg/body（30分）day1	21日	
悪性黒色腫	4	**Pembrolizimab（6週）**	キイトルーダ 400mg/body（30分）day1	42日	

【診療科：血液・腫瘍内科】

がん種		レジメン名	レジメン内容	インターバル	注意事項
悪性黒色腫	5	**Nivolumab+Ipilimumab**	オプジーボ 80mg/body (30分) day1 ヤーボイ 3mg/kg (30分) day1	21日	ヤーボイは最大4回まで
悪性黒色腫	6	**Ipilimumab**	ヤーボイ 3mg/kg (30分) day1	21日	ヤーボイは最大4回まで